



RS Tamba, Yasuyori
180 Ishin ho
J3T3
1935
v.5

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

顧問

井上通泰先生
山田孝雄先生
新村出先生

正宗敦夫

編纂
校訂

醫心方

自十八卷
至廿二卷

合資
會社
日本古典全集刊行會壽梓





RS
180
J3T3
1935
V.5



醫心方卷第十八

後五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治湯火燒灼方第一

治灸創不差方第二

治灸創腫痛方第三

治灸創血出不止方第四

治金創キムウ方第五

治金創キムウ勝出方第六

治金創腸斷タムケツ方第七

治金創キムウ筋骨傷方第八

治金創血出不止方第九

治金創血內滿方第十

治金創更接血出教書 更ニ接血有テ方第十一

治金創中風瘰方第十二

治金創禁忌方第十三

治毒箭所傷レタルヤナラ方第十四

治箭傷血滿痰滿方第廿五

治箭鏃不出方第十六

治鐵錐刀不出方第廿七

治醫針不出方第十八

治竹木快刺在肉中自脫不出方第廿九

治披打傷方第二十

治挽折破骨傷筋與痛目作之方第廿一

治從高落重物所箠方第廿二

治從車馬落方第廿三

治獐犬咬人方第廿四

治凡犬咬人方第廿五

治馬齒躪人方第廿六

治馬齒人陰外方第廿七

治馬骨刺人方第廿八

治馬毛血汗垢矢尿入瘡

治熊咬人方第廿九

治猪咬人方第卅一

治虎咬人方第卅二

治狐尿毒方第卅三

治鼠咬人方第卅四

治衆蛇螫人方第卅五

治蝮蛇螫人方第卅六

治青蛇螫人方第卅七

治蛇繞人不解方第卅八

治蛇入人口中方第卅九

治蛇骨刺人方第卅

治蜈蚣螫人方第卅一

治蜂螫人方第卅二

治蠅螫人方第卅三

治蝎螫人方第卅四

治蜘蛛螫人方第卅五

治蛭咬人方第卅六

治蚯蚓咬人方第卅七

治蛤蚧咬人方第卅八

治鯢螫人方第卅九

治射工毒方第五十

治沙虱毒方第五十一

治水毒方第五十二

治井冢毒方第五十三

治蠱毒方第五十四

治湯火燒灼方第一

病源論云凡被燒者初慎勿以冷物及井下泥及

蜜淋漬之其契氣得冷却深搏至骨爛人筋也

所以人中火湯瘡後喜率縮者良由此也

小品方治卒被火燒苦劇悶絕不識人方

冷水解蜜飲之噤瘥杖口与之

又方支子膏方

支子クニシ廿サ枚 白蔹ヤクニ五兩

黃芩ヒツナ五兩

咬咀

陳搏之義又云

皆應細切

三物咬咀サキ以水クサ五升麻油イワ一升合サ煎令水氣竭去滓冷之ハナ以淋瘡火契イワ毒則去肌皮得寬

葛氏方治湯火所灼ヤカ未成瘡者方

滑徒合及沸良

取冷灰以水和サ滑サ之サ以漬之サ又方破サ鷄子白サ塗之

滑徒合及合也

又方以豆醬ヒシホ塗之此三藥皆能トコ不痛不成瘡

又方末石膏塗之豆愈

若已成瘡者方

聖賢心方卷十八

三

以白蜜塗之竹中幕^ル恬^{ハナフ}上日三^ニ

又方煮大豆^{ハナフ}其汁以傳之

又方猪膏^{ハナフ}和米粉^{ハナフ}塗日五六^ニ

又方以好酒^{ハナフ}洗漬之

槌要方療湯火燒灼^{ヤキタハラセ}爛方

削梨^{ハナフ}恬^{ハナフ}不爛^{ハナフ}易愈

又方猪膏^{ハナフ}剪柳白皮^{ハナフ}塗上

已成瘡方柳皮燒作末^{ハナフ}粉之^{ハナフ}

醫門方云凡療湯火瘡欲塗傳膏^{ハナフ}散^{ハナフ}先取大豆^{ハナフ}煮

令汁濃待冷洗瘡熱後塗膏散極佳止痛無盤
療契湯膏油火燒瘡痛不忍方

狗毛細剪洋膠和毛塗上痂落不痛神秘

僧深方治火瘡方

醬清和蜜塗良一久將二乳蜜合和

又方猪膏煮栢皮傳之

千金方治火燒方

丹參無多少羊脂剪塗之神良
今系无羊脂用猪脂

又方死鼯一頭猪膏剪令消盡以付即老不作

癰神妙

又方榆白皮カム燬之

龍門方火燒瘡方

新出牛屎塗之

又方桑柴ササ灰和水付之

又方支子二七枚蜜三合漬ササ日三

新錄方鳩イナズナ慎火草塗之

錄驗方石灰下殺水和塗之

范汪方治火爛瘡蜜膏方

食蜜一兩 烏賊魚骨イカサヨヲ二銖 凡二物治烏賊魚

骨下節內蜜中燒令相得薄塗瘡上日二

耆婆方治人火灼爛瘡長毛駿方

取栢白皮作末和猪脂付之良煮汁洗之

刪繁方治火瘡灸瘡等膏方

栢樹白皮五兩 甘草一兩 竹葉三兩 生地黄五兩

凡四物切綿裹苦酒五合淹漬一宿用猪膏一升
煎取竹葉黃為度去滓摩傳瘡

治灸創不瘥方第二

病源論云夫灸之法中病則止病已則割若病勢

未折或中風冷故經久不羣也

葛氏方治火瘡灸瘡終不肯瘳方

細末烏賊與骨粉之ツツミ又方桑薪灰水和傳之

千金方治灸瘡不羣方

日別灸上六七壯自羣

扁鵲針灸經云凡灸因火生瘡長潤之ナレ不羣變成

火疽方取穀樹東邊皮煮奠去滓剪令如糖ナレ和散

付又方牛矢燒作灰傳之又方菟毛燒灰主灸瘡

不羣

僧深方治灸瘡不羗方

白蜜兩 烏賊魚骨二銖 二物和調塗瘡上

集驗方治灸瘡疔白膏生完心痛方

薤白オホミナラノ子 當歸オホセリ 各二兩 白芷オロシクセ一兩 羊脂ヤシ一升

凡四物咬咀与脂合合莫去滓滓傅之日二

治灸創腫痛方第三

病源論云夫灸創膿潰潰已後後更更炊腫炊急痛者此中風

冷故也

葛氏方治灸創及諸小瘡中水風寒腫急痛方

竈中カトウチ黃土水和煮令契漬之

カトウチヲアツカフ

詳カトウチノ治法ハ一醫心方等同

宝治五年醫心方同

又方但以火灸之令契アツ之則瘰シヤシ以シヤシ日六七日良暑

同

范汪方治灸瘡腫痛方 取葦搗以薄上以火灸令契入瘡

中日三

醫門方療灸瘡腫急痛方

栢白皮 當歸各ニツ兩 薤白切一ツ 猪膏一ツ

切以苦酒浸之ヒタセ三味一宿以微火熏三上三下薤白

黃芩度去澤傳上甚効

又方以艾灸瘡口日六七拉便差

治灸創血出不心方第四

音慕

病源論云夫針灸皆是節元俞募之處若病甚則風氣衝擊於創凡血與氣相隨而行故風乘氣而動於血ヨリ從灸創處出氣盛則血不心名為發洪也

千金方治針灸瘡血出不心方

燒人灰ツケ矢付之今糸繫馬矢封之

又方死蛻蝦トコ末猪脂和塗

范汪方治灸瘡血出不心方

蓮子草汁ウキタシ注中心冬月末干者付之今糸本草云鱧腸針灸瘡發洪血不可心者薄

蓮子之三名
蓮子草

治金創方第五

病源論云夫被金刃所傷其創多變動若按創邊于

急肌肉不生青黃汁出創邊寒清肉消夏敗前出赤血

後出黑血如乾爛者及血出不止白汗隨出如是者多凶

若中絡脉アタ髀内モ陰股天窓眉角橫斷腓腸乳上乳下

及与鳩尾攢毛在尻少腹尿後創出氣如責ナレ牝及脛出諸

創如是者多凶少愈

又云夫金創冬月之時衣厚絮温故畏欲薄夏月之

時^衣單且涼故畏欲厚

范汪方云凡畏縛^{六フ}金創用故布帛不寬^セ不急^セ如繫衣帶

葛氏方治金創方

急且斫^キ葉取白汁以厚塗之 又方燒馬矢傳創上

又方以石灰厚墮^{フセキ}畏之止血速愈無石灰殺^{モム}凡^ノ厭

可用 又方山行傷刺^セ血出卒無藥按^{モム}葛^ノ根葉傳^薄之

又方紫檀屑^{ソクタイ}傳之 又方即^{サナハチ}離中良

千金方云凡金瘡苦刺^シ痛不可忍^セ百方不^セ差方

葱^{ナギ}白一把水三升煮數沸漬瘡即止痛

天玄金瘡煩滿方

赤小豆一升以苦酒漬之イ熬カクイ復漬之滿三日令

色黑治服方寸匕日三

小品方金創無大小冬夏始傷血出方

便以白灰厚傅之血多仍累若創甚深不欲便令合者

內少滑石イシ令創イナ不時合又心痛セ急可內少牡蠣シノギ

若卒无白灰可用凡灰已膿中有虫白灰傅之旦虫

當出故并搗劉田方蓋常秘之セリ

劉涓子方治金創痛不可忍煩疼不得住心痛當婦

散方當歸一兩 甘草一兩 蒿カキモ本一兩 桂心一兩枳實抄有縱橫文木占斯

一兩九五物各搗下篩水服半方寸匕日三夜一

龍門方治金創方

地菰イヌシロ草イヌシロ嚼付之

今系本草云路邊地菰為金創所祕陶景注云搗薄之

又方燒青布作灰付之

豫要方療金瘡方

按生青蒿モム傅之上痛斷ヤメ血生肉

又方牡蠣シカキヲクヒ二分石膏一匁為散以粉瘡上即止

又玄瘡中有虫螫者入搗著之

又玄療刀斧諸瘡方

葛根為屑療倉劇止血要藥亦療帛漏^{ハクシ}猶^{ユウ}齒^シ

飲其汁良

又方搗^{ハクシ}耐冬^{ハクシ}刺之^{ハクシ}互^{トコロ}卷

陶景本草注治金創方

搗^{イキクセ}景天^{イキクセ}茶^{ハクシ}傳之^{ハクシ}又方搗薤白^{ハクシ}薄之

蘇敬本草注治金創方

搗落石^{ハクシ}薄之^{ハクシ}又方生桵草^{ハクシ}蒿^{ハクシ}傳之^{ハクシ}止血生肉

聖門方金創止痛止血方

艾葉ヲイ熟按ヲイ安瘡上畏之神驗

又方紫紫灰紫傳瘡上痛止血極効

救急單驗方療金瘡方

爵生粟黃付之 又方石灰和猪脂燒令赤塗

治金創腸出方第六

病源論云若中アタレ於腸則氣激トホ則腸隨創孔出也

又云腸但出不斷タエ者當作大麥粥取汁梅持洗腸以水

漬之内イナ當作研米粥飲之甘餘下日作強カク康食之百日後可進

飯耳

小品方金創腸胃脫出欲令入法

取人糞干末カレクル以粉腸上即入集驗方同之

刪繁方治金創腸出方

取桑皮經縫腸皮用イモ金子補腹黃粉カキコ之

劉涓子方金創中腹腸出不能イタ內方イニ

小麦五升モ水九升モ煮取四升去滓以綿度之漉使極

冷傷人含アキ避腸上自入イタ

又玄金創腸出欲入之慈石散方

慈石三兩消石三兩滑九二物下篩白飲服方寸匕日五夜

半法半發賣本寺無以字

每二日入

葛氏方腸書欲燦而草上著腸者方

作薄大麦粥使裁煖以液之以新汲冷水漬之腸

則還入草上タタ輩當跣ハ至後ハ聖又子陰又畏敬也礼記

跣ハ席是也在皮外也

治金創腸斷方第七

病源論云夫金創腸斷者視病深淺各有死生腸頭

見者不可連也若腹痛短氣不得飲食者大腸一日

半死小腸三日死腸兩頭見者可連續之先以針縫如

法連續斷腸便取鷄血塗其隙勿令泄モウ即推イシ內之

葛氏方若腸已斷者方

以桑皮キ細ヒ縫縫合鷄ニ契チ血塗之乃令入

治金創傷筋斷骨方第八

病源論云夫金創始傷之時半傷其筋策衛不通其
創雖愈ナキ已後ナキ仍令痺不仁也若被創ナキ截キ斷諸解身軀肘

中及腕ツデ腓ヒ髀ヒ若在踝隙亦可連續須急及契其血氣

未寒ヒ即ツ碎シ骨シ便縫連其愈後直不屈申若碎骨シ不去ケ令

人痛煩膿血不絕不能得オホ安ホ諸中傷人神ナ死シ生

小品方金創被^九筋^九絕令還續方

取蟹頭中髓及足中骨髓熬之內創中筋即生續之

治金創血出不心方第^九

病源論云金創血出不斷其脉大而心者三七日死血出不

可心前赤後黑或黃或白肌肉腐臭寒冷^十新急者其創

難愈亦死

固也

葛戎方金創中筋文脉血出不可心尔則血盡致人立愈

葵塩三指撮酒服之

千金方金創血出不心唾之咒曰

乙甲今日不良為其所傷上告天皇下告地王清血莫
流濁血莫揚良藥百裹不如熟唾日二十七度唾之即心

今案如意方
作神苦唾

又方補黃カウハナ一斤當歸二兩二味篩下酒服方寸匕日三

又方搗車前草オホユ汁付之又方以蜘蛛幕クモ貼之血即下

孟詵食經治金創血出方 按薊菜モロコシ封之

范汪方金創血出方 以白灰厚裹之

耆婆方治金創血出方 口嚼暑預以薄之辟風早卷

槌要方金創血不出方以熟艾傳之

又方麝香末傳之

又方以干馬矢掩之トク今案火焚掩之オキ

良

廣利方金創血不止方

騾驢竭末傳之 又方斫桑樹取白汁塗之

治金創血內漏方第十

病源論云凡金創通內血多內漏トホ若腹脹滿兩脇脹不能

食者死瘀血在內腹脹脉カタイ牢大者生沉者死ナル

葛氏方若血內漏者方

服蒲黃二方寸匕血立下トコロ 又方煮小豆服汁五升

又方以黑盛湯令契熨腹達内則消

又方掘地作坎以水浹坎中攪之取濁汁飲二升許

牡丹為散水服三指撮立尿血者

千金方金創内漏方牡丹為散水服三指撮立尿血者

醫門方金創血内漏腹滿欲死方

白朮ウロニン 黃耆カハラセキ 當歸オセリ 續斷オウゴフ 芎藭シニナカシラ 甘草各分 薤白カアツク

乾地黄 各十二分

搗篩為散空腹以酒服方寸匕日三服血化為水下口

噤ツツラ加大黃十二分

治金創交接血驚方第十一

病源論云夫金創多傷經絡吉血憤氣其創未老則血

氣尚屈若目而房室者致情意感動陰陽發泄驚觸於創

故血汁重也

葛氏方云金創未愈以交接能血漏驚者則教人方

急以蒲黃粉之天方取所交婦人中裹帶寸燒末

服之

治金創中風症方第十一

醫門方治金創中風症欲死方

生葛根一斤切以水九升煮取三升去滓分三服無生葛以

乾葛末溫酒服三指撮若口禁多飲竹瀝亦佳

方藏經補有二字

タケノコ汁

治金創禁忌第十三

葛氏方云金創忌瞋怒大言大咲思想陰陽行動作力

字名克

多食飲臾酸飲酒熱羹臠アモラ皆使創痛創老後百日半耳

乃稍復常耳

又云若多飲粥タケ革則血溢アツル出教人

陶景本草注云金創禁食猪羊梨

治毒箭所傷ラレタル方第十三

病源論云夫被弓弩所傷若箭鏃有箇藥入人皮脉令

人短氣須臾命絕口噤脣干血為新絕腸滿不言其人

如醉未死之間為不可治若營衛青瘀血應時生創邊

壯熱口開能言其人乃活毒箭有三種嶺南夷裡用燄

銅作箭鏃次嶺北諸處以諸蛇虫毒螫物汁著管中

漬鏃此二種纔傷皮便洪腫沸爛而死唯射猪犬雖困

得活以其取真故也人若中之便即食糞或飲糞汁并

塗創即愈不尔須臾不可復救箇箭著處者難困漸

活不必死若近脅腹便宜速治小緩毒入內則不可救矣

葛氏方云治卒被毒箭方

搗藍青絞飲汁并薄創无藍可漬青布及紺

絞飲汁以汁灌創中又方服竹瀝數合至三升

又方煮藕飲汁多之益善又方以塩滿創中灸塩上

千金方毒矢方

煎地黄汁作丸服百日矢當出

又方煮蘆根汁飲三升

小品方卒被毒箭方

春藍汁飲之亦灌_創得藍即醒

又方服補黃二合許而止下又方服麻子汁數升
范汪方治毒箭所傷方

捫葛根食之如常食法發多為佳千金方飲汁

又方干薑藍青鹽分等搗和傳創上毒皆去

又方末雄黃薄瘡當沸汗流便愈

集驗方治兵創醫不能治方

剥ハク棗白皮去上黑者以裹之棗白汁入創冬月用ナラ棗根

皮汁

治箭傷面漏瘰滿方第十五

錄驗方治射箭鏃入腹破腸中血滿葵子湯方

取葵子ヤフヒスミ二升小便四升煮取升頃服下書即差

又云治被箭血內漏腹中瘀滿菝子散方

干薑二兩 菝子ヤフヒスミ二兩 凡二物治菝先食酒服方寸匕

又方蘆茹散 蘆茹子七七三三兩 杏仁二兩 凡二物治菝先

食酒服方寸匕

治箭鏃不劣方第十六

病源論云箭中骨破ヤク碎者須令箭鏃ホレ出仍夜碎骨乃傳カクヤタタ

藥不令創永不合縱創合常疼痛若更犯觸損傷便

驚血沸潰有死者

葛氏方治箭鏑及諸刀刃在喉咽骨間諸隱處不出方

搗杏仁塗之又方以蜈蚣腦塗之

千金方治金箭不劣方

白蔞半復ヤカミ ホンソウ分等末擘服方寸匕日三今案錄驗方白蔞三兩半復于三兩葉下篩

永服方寸匕日三輕淺創十日若深創廿日若終遂不傳完中

小品方治箭金在喉咽骨背障中及在諸處不劣方

牡丹一匁 白蔞一匁 末擘服方寸匕日三自若今案千金方白蔞二匁

又方取婦人月經衣已汚者燒末擘服方寸匕日三

書集驗方同之

錄驗方治箭鏃入人腹中不出瞿麥散方

未瞿麥ナチシ酒服方寸匕日三夜再服可治百刺急和酒塗

又玄箭入人身經三五年不書方

麻子三升作末以水和使得三升汁溫服之須臾出

龍門方瘡箭鏃入腹不書方

枯樓カラ搗付瘡上日三自出

治鐵錐刀不書方第七

葛氏方治鐵入骨不書方

取廉角燒作灰猪膏和傅之

錄驗方治箭鏃及兵刃錐刀刺折在身中不書方

治箭 白芷三分 白殿三錢 凡二物治發洩服一刀圭日三

又玄治錐刀入腹方

梨花煮取汁服之大良

治醫針不書方第十八

錄驗方治醫針不書方 搗杏仁塗之

小品方治箭金及折針不書方

以鼈腦塗之

又方以鼈オメ乙婦塗之 又方以オメ乙蝟ケウ蛇腦塗之

醫門方療箭醫針在肉中方

細刮象牙屑以水和之如杏著折針上即拂赤瘡

刺不書者。本品方同之

龍門方治針不書方

燒羊毛作灰和猪脂傅上半日自書

治竹木狀刺不書方第十九

葛氏方諸竹木刺在肉中不書方

用牛膝根莖合鴉以薄之創口雜合自書

又方燒鹿角末以水和塗之立書遠久者不過一宿

郭知玄刺
在肉中自註

又方搗烏梅ホシメ水和塗上立効今案集驗方用白梅

又方爵敗クハ塗之

錄驗方諸竹木刺壯不出方

末王不留行九ノミ服即効

又方鹿腦ノミ厚クハ傳ツ于復フ易ヨ元鹿腦者用鼯腦

治被打傷方第廿

病源論云夫被打クハ陷クハ骨傷腦クハ頭眩クハ不舉戴眼直視クハ不能

語明中沸聲如牝子キコ喘口急キコ卒為忘取即日不死三日愈

小品方治為人所打擊若見鎮ツル芥ツル頭破ツル胞ツル出已死尚有

氣在胷心間方

在胷心間方

取^井純^{ナカラ}血及^{ナカラ}契^{ナカラ}以灌腦中令滿瘡裏無^{ナカラ}乾者唯^{ナカラ}趣得

熱血而灌之

又方服水銀如^{ハカリ}大豆即活

千金方治頭破腦^{ハカリ}中風口噤^{ハカリ}方

大豆^{ナベ}一升^{ナベ}去^{ナベ}腥勿使大^{ナベ}熟^{ナベ}鴛^{ナベ}米^{ナベ}蒸^{ナベ}之^{ナベ}氣^{ナベ}逆^{ナベ}合^{ナベ}飢

下^{ナベ}盆中以^{ナベ}酒^{ナベ}一^{ナベ}升^{ナベ}淋^{ナベ}之^{ナベ}溫^{ナベ}服^{ナベ}一^{ナベ}升^{ナベ}覆^{ナベ}汗^{ナベ}付^{ナベ}杏^{ナベ}人^{ナベ}膏

又云被打傷有瘀血方

補黃一升カクハナ當歸二兩桂心二兩三味酒服方寸匕日三

又方豉一升以水三升煮三沸分再服

又方生地黄汁三升酒一升半モ煮取二升七合分三服

又玄治癰血在腹內服大小勸前汁五六合

葛氏方治挽クキフミ蹴倒多有損下伏及痛處氣急面青者方

干地黄半斤酒一斗漬火溫稍飲汁一日令盡之

又方搗生地黄汁二升酒二升合煮三沸分四五服

又方干地黄六兩當歸五兩水七升モ煮取三升分三

服若煩悶用生地黄一升カシタ代干者

五握字補實及兩半擊也

七

又玄治為人所玉擢攢舉身頃仆垂死者方取鼯九毛

李皮削去上黑切酒漬半日絞去滓飲一二升

又玄若為人所打舉身盡有瘀血者方

刮青竹皮二升オナ乱オナ髮如鷄子大四枚炙令焦与竹皮オナ

合搗末以一合内酒一升中煮三沸頃服之日四五

過天內補黃三兩

又玄血聚皮膚間不消散者方

取猪肥肉炙令契以榆上オホ又方馬矢水モ煮薄土

又玄被擊打瘀血在腹內久不消時ハ殺動者方

大黃干地黄末為丸散以酒服

又方蒲黃一升當歸二兩末酒服方寸匕日三
又玄若久血不除變成膿者方

大黃三兩桃人廿枚杏仁廿枚酒水各五升煮取

三升分三服當下膿血

新錄去治頭破方

朱氏

猪脂和石灰及塩燒為灰付上

又方生地黃不限多少乾搗薄傷處

朱氏

劉涓子方治被打腹中瘀血白蹄散方

了凡

馬

醫心方卷十八

七

白馬蹄燒令炆盡搗篩溫酒服方寸匕日夜一

今葉廣利方云
面化為水即下

范汪方去血湯主腸中傷積血方

黃赤小豆下力下平二升合得汁二升以淳苦酒七升合和汁中

飲一日盡之狀如契湯浚雪即消下甚良

治挽折破骨傷筋方第廿一

病源論云凡人傷折之法即夜盜汗者此髓折也七日

死不汗者不死

小品方治挽折四支骨方

若有聚血在折上以刀破去之不可冷食也春大豆

以猪膏和塗聚血上煖復易之

又方燒鼠屎猪膏和傅血上甚良

葛氏方凡挽折骨諸瘡腫者慎不可當風卧濕及自

扇中風則菰^{下タレ}症口噤^{ナセル}致人若已中此覺頸項強身中

急者方急作竹漚飲二三升若口已噤者以物強用

菰^{ヒライ}內也禁冷飲食及飲酒

又云挽折四支破骨碎及勸傷跌方

熟^{コナ}搗生地黄以薄折上破竹筒編之令竟病上急縛^{二八}

之一日一夕十易地黄三日後則羸

又方活鼠破其背取血及契

イナル
以薄之立愈

今案極要方神方云云

千金方治四支骨破碎勸傷蹉跌方

玉采何及不盡力也玉采結及蹉也蹉也

水二升漬三升豉取汁服之

又方初破時以契馬矢付之无瘰

未タ九
力七ト云

又方大豆二升水五升煮取二升淳酒六七升合豆汁

服之一日盡之如湯浹雪

又方生地黄不限多少契傷用薄損傷處

樣要方療平脚折方

クシケタ九

取生地黃ヒツシキ熟搗ヒツシキ以傅折上破竹木編之急縛之一日

夜十易地黃三日後則差

又去療傷折筋骨疼痛方

右以酒煮折傷木イシヒ濃汁飲之

新錄方桂キナ蘓方木二升以水二升酒二升煮取一升六合服

又方接骨木ニキハキ煮服シメ依蘓方木法今案接骨木水煮洗之又水楊煮汁洗浴之

治從高落重物所打方第廿二

葛氏方治人從高墮下若為人重物所填シメ得瘀血方

豉三升以沸湯二升漬之食頃シメ絞去滓以蘓黃三合

投中盡服不過三四服神良

又方取茅薊蓮根ヤブコ葉ハルナ搗絞服汁一二升不過三四服

愈 又方末鹿角屑服三方寸匕日三

又云卒從高落下瘀血振心面青短氣欲死方

地黄干生无シメツ在隨宜用服取消

又方煮大豆若小豆令熟飲汁數升消和并佳

又云為重物所填シメツ卒欲死方

末丰复如大豆者シメツ以內其兩鼻孔中此即五絕法

小品方治從高墮下腹中崩傷瘀血滿斷氣方

服補黃方寸匕日五六過今案龍門方和酒服

又方春生地黄酒浹取汁稍服甚良

又云治從高墮ウツ若為重物所鎮ツカシ迫得瘀血方

作大豆紫湯如產婦法服之

千金方從高墮折クシ疼痛煩燥シ啼叫ナキヒヤム不得卧方

取鼠矢燒末篩以猪膏和塗痛上即安シヤル

又云從高墮下崩シヤル中方

當歸二分大黃一分二味酒服方寸匕日三

搗要方療目墜損恐內有瘀血方

服帛魄屑神驗能治瘀血

腎門方療卒隨損筋骨蹉跌或骨破研方

瘀搏生地黃薄之日夜數易之若血聚者似

針決去之ヒタシ又方浸地黃酒飲之令酒氣不絕佳

治從車馬落方第廿三

葛氏方治忽落馬ヨリ墮車及墜屋坑岸ツキ挽傷身軀頭

面四支内外切痛煩燥コトケ叫喚者方

急多覓モトメ鬲矢燒搗以猪膏和塗痛處急裹之

千金方墮落車馬心腹積血唾吐無數方

干藕根末酒服方寸匕日三分藕根汁浸之

又方酢和麵付上

選要方療墮馬崩五腹滿短氣欲死方

大豆五升以水一斗煮取二升半一服令盡劇者

不過再服即愈

新錄方去鴛生地黃封之

治獺犬咬人方第廿四

病源論云九獺犬咬人七日輒一發過三七日不發則

無苦也要過百日乃為大免耳創未愈之間禁食生

醫心方卷十八

六

與猪鷄肥ニヤクモ過アフラキ一年禁之カフヤモ佳但於飯下並與及於肥

器中食便發若人曾食落葵得大齒者自難治若創

差十數年後食落葵便發錄驗方犬食馬完生瘡

者當急救之多令犬モクシ捕也亦可搏苟把根取汁糞

米與犬食之則不捕ハミル

小品方云禁飲酒食猪完生菜イメ鱸ナケル鮓鮓

葛氏方云凡狗春月自多捕治之方

以豆醬塗創日三四過セ

又方末干薑常服少并以内瘡中

又方即末樊石內創中裹之心痛不燥速愈良最

又云若重發者方

搗蘆根飲汁即差卷又方薤白搗飲汁良

經心方治獠犬齧人方クハ

以人屎塗之大良又方驗酢以壅創上即差フエケ

小品方治獠狗齧人方

嗽去其惡血灸其處百壯以後當日灸百壯血不劣ル

者小刺傷之灸百壯乃心今案葛氏方頸灸十壯明日以手去日灸一壯滿百日乃心

又方取杏人熬令黑治著創中佳ハキ

千金方治獠犬咬人方

搗韭絞取汁飲一升日三亦療已愈而後發者今系葛公

方又每到七日飲之

又方取燈殘油灌創中

醫門方療獠犬咬人方

煮地榆汁飲之毛似子煮末傅瘡中忌飲酒

又方艾子皮燒石留黃末未分等傅瘡上日三連卷

又玄若諸療不差吐白沫毒攻心世又叫喚欲似犬聲者方

取人髑髏骨火燒作灰下篩以東流水服方寸匕

須史三三服即差起死才流如神

鎌要方狂犬傷人方

以蚯蚓矢封之書犬毛神効

新錄方云搗生艾葉汁服七合又方車釐脂塗之

又方搗生葛根取汁服七合又未付之

錄驗方云取大蒜作餅灸創上即愈

又方火銷臍蜜署創中

治凡犬咬人方第廿五

病源論云凡被狗咬創忌食落葵稚菜經一二年亦

重發

葛氏方治凡犬^{クハ}咋人方

以沸湯和灰以塗創上又苦酒和塗之

又方按^ア菴^{タカ}以薄創冬^ナ月煮洗之

又方以契牛矢^{アタカカ}塗之又方搗干薑^ア服二方寸匕

又方生薑汁飲半升佳又方以頭垢^ア少^ナ內創中

集驗方治凡犬咋人方

以火炙臍灌創中又取竈中契^ア灰^ナ粉^ナ創中裹

傳三愈葛氏方同之

醫門方凡犬齧人方

取杏人焚熱搏傳瘡頻易

又方鼠屎二七枚燒灰之傳上永卷

經心方燒犬尾末傳瘡上日二良

治馬咋^シ踰^{フスル}人方第廿六

病源論云九人被馬齒踰及馬骨所刺并馬韁勒^{タテ}所^{ホタシ}

傷創皆為毒創若致煩悶是毒入腹亦斃人也

葛氏方治馬咋人及踰人作創有^ナ毒^腫熱疼^腫痛方

割雞冠^{七カ}血漚著創中三下若父馬^{ナラ}用^ニ雞^ニ草^ニ馬^ニ用

雄雞 又方灸創中及腫上又方以月經^{ケカシヲモウ}傳上最

婦人月水是也

良

樣要方療馬齒人及踏人作瘡腫^毒契疾痛方

馬鞭鞘^七長二寸鼠矢二七枚合燒末以膏和陸

之三驗^愈

小品方治馬咋蹄方搗車前^{才亦八二}葉薄之

經心方治馬咋蹄方

中藥九卷

雄黃傳瘡上曰一又方用銅青傳瘡中好

陶潛方云制馬齒人方

取僵蟬屑塗馬上屑則不能齒也

治馬齒人陰殍方第廿七

集驗方治馬齒人陰殍方

推内^レ之以桑皮細繅^レ之取烏鷄肝細剉^レ塗之且忍
勿即小便^レ愈千金方同之

治馬骨刺入方第廿八

醫門方治馬骨刺入^{セリ}毒欲死方

以婦人月經^{ナカレモツ}血傳之即差

新錄方治馬骨刺入方

松葉水^モ煮取汁洗之又方水^モ煮大豆取濃汁洗之

又方煮藍取濃汁洗之并服汁五六合

刪繁方治馬骨刺入方 燒干馬矢^{タカ}救瘡孔中

治馬毛血汗垢矢尿入瘡方第廿九

小品方治馬骨所刺及為馬所躐フミツハ吓ツハ為馬汗血毛垢矢溺六分

入人瘡中及人有創而近馬物毒氣入創中先針刺傷

書新血數過嗽去之

研鼓作湯令小沸以漬創又方可用契灰汁

又方煮馬莧草今立洗之并服汁又方以車前草葉

搗名傳之

集驗方治馬血入人瘡中方以人糞傳瘡中

又云治馬汗馬毛入人瘡中腫痛欲死方

以承漬瘡數易水便愈

葛氏方云人體先有創而以乘馬汗若馬毛入創中或為馬氣所蒸皆致腫痛煩契入腹則斂人方

大飲淳酒取醉則愈又方煮豉作湯及契漬之

冷易

又方為馬骨所刺及馬血入人故創中^{ツルキ}毒痛欲死方

以契灰汁更^{アタメ}燂^{ニテモル}漬之常令契^{ニテモル}竟日為之冷即易數

日乃愈若瘡^{痛故}心而腫不消者多^{アツ}石^モ尉^モ之灸上名佳

又方搗麻子^ツ絞^ツ飲其汁^ツ并日三

治齧齒人方第廿

葛氏方治齧帛創方

燒青布以薰創口毒即止仍煮葛根令濃洗

創日十過并葛根搗碎以葛汁服方寸匕日五創甚

者夕一服 又方削楠木煮以洗創日十過

治猪齒人方第廿一

千金方治猪齒人方

松脂練之括上 又方屋雷中泥付之

治帛齒人方第廿二

小品方治瘡毒方 燒青布以熏創口毒則去

又方燒婦人月水汚衣末傳創中

又方嚼栗塗神良

千金方治瘡瘡方

煮葛根洗之十遍復飲汁又搗散服せう方寸匕日五夜二

又方煮鐵令濃洗之

醫門方療武咬人方

取青布急卷為繩繞一頭令燃注し內竹筒中是佳瘡

口令烟薰入瘡中遂佳

又方但飲酒恒令醉當吐也

挖中方治帛狼所咬創方

取竈中黃土^{カチンコルアカ}好苦酒和付創上當有汁也良

治狐尿毒方第卅三

病源論云夫野狐尿

^{ナメハ}刺頭人誤犯之者則中其毒多

著手足指腫痛^{ナメハ}燠契有端居不^{ナメハ}著此毒者則不^{ナメハ}是

狐尿刺也蓋惡氣耳故方亦云惡刺毒

葛氏方治狐溺棘刺人腫痛欲死方

破鷄子以搗之良 又方以契乘灰汁漬之冷復易

錄驗方治抓尿刺方

取猪胎臨燭上以火燒之令胎隨所患處一掃愈

又云治惡刺方

取夜光骨玉女辟燒作灰和臘月猪脂傳之夜

光骨燭燼是也玉女辟猪髀是也

又方取大豆汁搗葱和傳之又方杏人研和水煮浸之又方取夜光骨搗內創中虫出即差

枕中方治抓刺創方

取葵子煮取汁洗之

龍門方治狐尿刺方

取槐白皮煮湯漬之驗又方大麦燒灰和蜜塗
又方蟻穴中^{ヨリ}取^{タリ}七粒和酢塗驗

雞新錄方治狐尿刺方

生麻茶搗封數易又方水^モ煮^{ナク}蓴^{ナク}青子^{ナク}汁洗之

又方搗^{ナク}薤^{ナク}根^{ナク}封日易又方搗水^{ナク}楊^{ナク}茶^{ナク}傳之

又方酢和^{ナク}鼠矢^{ナク}灰付之又方搗蒜如泥^{ナク}敷^{ナク}壓^{ナク}之

又方水^モ煮^{ナク}苦^{ナク}參^{ナク}汁洗之又方燒艾熏之又方牛屎

傳之^{ナク}

治鼠咬人方第卅四

醫門方療人被鼠咬諸處皆腫經年月不差其咬處有赤脉者是也

草殺七殺又作菴十二枚カニノクサ三合皮切以水二升煮取一升去滓頓服

了并爵傳瘡上豆菴

治衆蛇螫人方第卅五

病源論云凡中蛇不應言蛇皆言虫及云地藥勿丁モシク正

言其名也惡蛇之類甚多而毒甚劇ヤハハシキ特四月五月中

青蛙ハニ三月蒼虺ヒカケ白頸大蜴ヒカケ六月中竹將ハア艾螭黑甲

赤目黃口及鉤白蛙角ア此皆蛇毒之猛者中人不即

治多死又云有赤連音連黃領之類有六七種水中黑色者

名曰蠺山力制及中一種亦相似並不聞螫人

又云有鉤蛇尾如鉤蛇尾如鉤能倒牽人獸入水沒而

食

鉤古庚又

又云南方有鉤蛇人忽傷之死則終身伺覓其主不

量雖百人衆中亦直來取之唯還去者百里乃免耳

又云有拖蛇長七八尺如舩拖吠毒人必死即削取舩拖

煮汁漬之便差

蛆痛也也
也

又云蜈蚣毒此是諸毒蛇夏日毒盛不泄皆齧草木及吐毒著草木上人誤犯著此者其毒与被蛇螫不殊但創腫上有物如虫蛇眼狀以此別之

又云凡蛇創未愈禁喫食也便發

本草云蛇虺百虫毒雄黃巴豆麝香干薑並解三七

葛氏方云中蛇毒勿得渡水也則痛甚於初螫雖七、レ、ク、ル、ヨ、リ、モ

車船急不免

天云治衆蛇螫人方

搗蔞草モクフ以傅瘡上立愈神良

果心方卷十八

十六

又方搗生蓼絞取汁飲少々以滓薄之

又方按青藍薄之 又方爵干薑傳瘡上

又云治蛇創敗經月不愈方

先以塩湯洗去創中敗肉見血心取干金鏹草鴨
蘆フルフ之傳之則愈

又云治蛇螫人創已合ヤカラ愈而餘毒在肉中淫痛痒方

取小大蒜各一升合搗熟湯淋之モ以汁灌創良春

薄モ亦良

又云治蛇螫人若通身洪腫者オホキ方

取糠四五斗著大甕ハツ中以水浹之令上未滿五升許又以好酒浹之以置火上令沸氣出薰創口使毒去則消

僧深方治衆蛇螫人方 以頭垢アケ著創中大良

槎要方蛇螫方 含口合口枳フヒヒ蒼耳苗カア合ナモ搗ア以ニ傳ニ瘡ニ上ニ

又方生枳三合好豉四兩以人唾ハキ和ア搗セ傳ニ之ニ瘡ニ上ニ

云々金葉單搗生
枳付之良

集驗方治衆蛇螫人方 搗大蒜塗之即愈

廣利方蛇咬瘡方

雄黃四分 乾薑六分 麝香一分 研クダ 持チ 從リ 以テ 驗ル 醋和塗

瘡上

又方暖酒淋洗日三良

龍門方蛇螫方

蜂巢燒灰封老 又方鳩梨付之 耆婆方同之

又云毒入腹者方

羊蹄草葉一握 鳩汁飲吐老 耆婆方同之

耆婆方惡蛇所螫方

取苦苣菜ナツ 鳩薄螫處 又飲汁二升即老

又方搗車前草オホハコ根茎付驗

蘓敬本草注云衆蛇螫人搗茺蔚オホトキ薄之

又云蛇螫人通身腫櫻桃カセクラ葉搗封之又絞汁服之

穀目方治蛇虺螫人方ハカヲニヌカハセクヲフニ

急矣螫處二七炷然以雄黃麝香末傳之日五六九

无藥但灸之 又方荏菹ヲラエ就火燒猪脂和薄上三愈

治蝮蛇螫人方第廿六

病源論云凡蝮蛇中人不治一日死若不早治之縱不死者シトモ

多殘斷人手足蝮蛇形不乃長頭扁口尖頸斑身亦艾シラヒトカリ

斑色青黑人犯之頸腹^{ハナ}佑^{ハナ}著地者是也其毒最烈^{ハナ}

又云有一種狀如蝮而短有四脚能跳來^{ホトハナ}齒人東人名

為千歲蝮中人必死然齒人竟^{シム}即跳上樹作聲云^ホ斫木^{之害也}

者但營棺若云博^{ハナ}井^{ハナ}者猶可急治

又云虺形短而^{ハナ}編^{ハナ}亦青黑六七月^{ハナ}中夕時^ホ書路上喜入車

轍腹破而子^{ハナ}書人侵晨^{ハナ}冒^{ハナ}骨行者每^{ハナ}須作意^{ハナ}著之其

螫人有死者
虺^{ハナ}蝮蛇也

呼鬼切

葛氏方治蝮蛇螫人方

搗小蒜絞飲其汁以滓薄創又方搗菲薄之

又方爵塩唾創上訖灸創中三壯復塩爵以唾

付創

又方細末碓黃以內創中三四傳之

集驗方治腹^腹蛇螫人方

令婦人溺^{赤下丸}所螫上

又方令婦人坐上^魚

千金方治蝮螫方

灸上三七壯 又方熟搗葵取汁服之

藥敬本草注蝮蛇螫人方

搗落石紋汁洗之并服良

耆婆方蝮蛇螫人方干薑屑薄之

廣濟方治毒蛇齒方

取慈孤草根搗薄之即卷其草生水中如響尾

大効勿輕

槩要方療蝮蛇瘡方

酢磨蝮蛇傳之 又方搗水蓼薄之并服汁

蝮蛇
苗似王孫鬼
臼芽有三三
層根能大
昌蒲細
肌脫白

集驗方治蛇虺諸毒螫方火消蟬以著瘡中

治青蛙蛇螫人方并世七

凡八力

病原論云青蛙蛇者正綠色喜緣樹及竹上自掛樹竹
色一種人卒不覺若入林中行有落人頸背上者然
自不甚齒人必死此蛇無正形大者不過四五尺世皆
呼為青條蛇其尾三寸色黑者名鳩尾毒最猛烈中令
死

葛氏方云青蛙中人立死竹中青蛙蛇螫人方

葵創中三壯毒即不行也卒无艾刮竹皮及紙皆

可以九天了無此者便以火燼就契燒創

范汪方治青蛇螫人方

又方破烏雞冠血及熱以搗瘡上

雄黃干薑末付瘡良

治蛇繞人^{トコラ}不解方第廿八

葛氏方治蛇卒繞人^{トコラ}不解方

以契湯淋之即解若無湯者令人就溺之必解^{トコラ}今案千金

方集驗方
同之

治蛇入人口中方第廿九

葛氏方治蛇入人口中不書方

以艾灸蛇尾^ヲ即書若無火者以刀周迴割蛇尾裁令^{ホカニ}

皮折乃引之皮倒脫得書^{ホカニ}

千金方蛇入人吊不毒方

以刀破蛇尾内生樹三四顆須臾即若

治蛇骨刺入方第卅

葛氏方治蛇螫人牙折人完中不毒痛不可堪方

取蝦蟆肝カハナ以傳上立效小品方同之

又云蛇骨刺人毒痛腫契与蛇螫無異方

以鐵精如大豆者以管吹內創中ハカリ

又方燒死鷄鶩末傳創中

僧深方治蛇牙折完中不毒方

醫心方卷十八

子乙

取生鬺契血塗瘡以綿芭之二日也

又鮑骨刺人取雄黃如大豆內瘡中

治吳公公方整人方第一

病源論云吳公此即百虫也雅復有毒而不甚整人

誤觸之者故時有中其毒者耳

本草云吳公毒用桑根汁解今案新錄方云立痛心

葛氏方吳公自不甚齧入其毒亦殊輕於蜂今赤

足螫人乃痛於黃足是其毒烈故也亦是雄故也治之

方以塩拭創上即愈又方頭垢少許以苦酒塗之

又方破大蒜以醋之他レ又方按藍汁漬之即愈

小品方云割鷄冠血塗之主方又方以塩湯漬之即愈

新録方云蛇銜菜搗如泥封之此方又方在菜搗如泥封之此方

僧深方云消蝟蜜浸傷中良此方

醫門方云鷄屎和醋塗上便愈此方

治蜂螫人方第卅二

病源論云蜂類甚多而方家不具顯其名唯地中大土

蜂最有毒一枚中人便即倒悶舉體洪腫諸藥治之此方

皆不能卒止舊方都無其法然雅不能致人有採術

封蛭亦微効又有胡改反蜂即亦其次餘者猶差

本草去蜂毒用蜂房藍青解

葛氏方治蜂螫人方取人溺ナリ洗之又方斫ナリ穀樹取白汁塗

之極要方又方煮蜂房洗之又燒ナリ末膏和ナリ傅之

又方刮ナリ齒垢塗之又方按藍青尖ナリ葉者塗之

小品方治蜂螫人方

取蜘蛛蓮ナリ創上又以活蜘蛛ナリ放毒上其自歎ナリ毒

千金方蜂螫人方

蜜五合蠟二合猪脂五合和煎ナリ稍食之

又方燒牛矢灰若酒和塗之 又方嚼塩塗之

搗要方云所乘樹白汁以塗之

治螭螫人方卅三

病洎論云薑虫方家亦不^{アキラ}能辨^ハ云是螭^{トカ}蛭^カ子^ト成云

是小烏虫尾有兩岐者^{フタノタテ}忌非也疑是^{ラク}鰍^{ナラム}尾岐而曲上故周

詩曰彼都人士卷髮如薑也^{ナナ}

葛氏方云厲字應作薑字所謂鮮薑治之方

搗常思草絞取汁以洗之 又方灸創中十壯

又方灸屋凡若凡器令熱以慰之

小品方蠮螋人方取屋雷下土以水和傳之立愈

治蠮螋人方第卅四

病洎論云蠮螋此虫五月六月毒最盛云有八節九節者

毒弥甚但中人毒契流行牽引四支皆痛過一周特始

葛氏方云蠮螋中國屋中多有江東無也其毒應綴今石

榴樹多有耗虫云

七吏及毛虫有毒也

治之方溫湯漬之又方按馬莧塗之

又方嚼大蒜塗之又方嚼干薑塗之

千金方云取齒中殘飯付之又方硃砂乃朱砂和水塗立愈

又方猪脂封土 又方以井底泥付之

新錄方云煮甘草汁服之 又方醬汁塗之

又方尿泥塗之 又方搗芥子カシ末酢和塗之

又方濃煮塩汁洗之 又方艾炷上二十七炷

廣濟方云半夏以水研塗之立止 又方塗黃丹之

龍門方云溫酢漬カシ毫

撻要方云嚼人衆傳之立驗 又方削桂心酢磨塗之

蘇敬本草注云搗麻葉薄之

廣利方云猫兒糞塗螫處日三

又方破蜘蛛汁塗立止時始定

集驗方云蠍有雌雄二者痛心在一處雌者痛牽諸處若雄者用井底泥傅之溫復易。

雌者用當屋瓦弄下浸傅之若不值天雨无泥可用新汲水井從屋上淋於下取泥傅之

治蜘蛛咬人方第卅五

本草云蜘蛛毒用藍青麝香並解

拾遺云蕪菁子和油傅蜘蛛咬毒入內亦為末酒服蕪菁園中無蜘蛛是其相畏也

又云土蜂赤黑ル色燒末油和傅蜘蛛咬瘡此物食蜘蛛亦其相伏也ル

千金方云烏麻油ウマ和胡粉如泥塗之干則易之

廣濟方云取生鐵上衣用醋ル研取汁塗之

醫門方云蜘蛛咬經年不差方按半夏ホソク苗薄大効

雜要方云白彊カヒコ蜚末以唾和之塗上

又方取蘿摩カヒコ章鳩如泥封上又方柳皮一兩半夏

一兩燒作灰塗之

傳信方云療蜘蛛咬クハ遍身生絲方

取羊乳一味久服愈為度

貞元十一年余偶到奚吏部宅坐客有刑部

崔從質トスエヲ目話カタリ此方崔云目擊有リキ人被蜘蛛咬腹

大如有娠遍身生絲其家弃之乞食於道有僧
遇之教飲羊乳得愈平伏

治蛭齧人方氣卅六

病洎論云山中草木路上及石上石蛭著人則穿齒

肌カハ皮行入肉中浸淫シルナ起創

千金方云灸斷其道即愈

又云凡山行草中常以臍月緒膏和塩塗脚及足
ハヤル指間及著鞋雖不得著

治蝨刺咬人方第卅七

傳信方療蝨刺咬方 常濃作塩湯數浸洗而愈

浙西軍將張韶為此臣所齧其形如患大風肩鬚

皆落每夕則蝨刺鳴于體中有僧遇諸途教用此

法尋愈

治蛭螭咬人方第卅八

本草拾遺云蛭螭咬取蓼藟薄瘡上及浸之

今采本草云蛇蟪一名玄蝸和名奈女久知

治鰥蝥毒方第卅九

病源論云蝥既是人養之物性非毒害之虫然時有咬人者
者乃令人剪寒壯契經時不老亦有目此致斃斯乃一時
之恠異無逼救解之方

新錄方云鰥蝥毒方

酢和鼯屎如泥塗上又方酢和鷄屎灰封之
廣洛方療蝥及蜘蛛方

亭厯子四分ハククナ 鮑床子四分ヒルカシロ 菟糸子四分チリシメ 塩四分

石搏節和三年驗醋如泥塗瘡上日三

治射上毒方第五十

病源論云江南有射上毒虫一名短狐一名蟻ワ常在山澗

水内此虫口中内有橫骨如角弓形或本元正黑如大蜚生齒アタタムシ髮

而有雌雄之者口邊有兩角ツノ端有桎ツタ屈申冬月在

土内蟄其上氣蒸ハ休ト有雪落其上毛詩云身安休之如不凝コウ復月在水内

人行水上及以水洗浴モ或曰大雨潦時逐水流入人家

或遇道上牛馬跡内即停住ホトリ含沙射人影便病初得或

如傷寒或如中惡朝旦小蘇脯夕輒ハケシ始得三四日尚可治オク

要方卷之八

廿五

急者七日緩者二七日速者三七日皆死初未有瘡但惡寒

所歸及惡寒病也

瘰癧所貴又
陰云瘰
又寒病

瘰癧瘰癧寒契盛如針刺其成瘡或如豆粒黑子或如火燒

寒契之狀

或如蠅螬尿瘡皆因有穿空如大針孔也

內六分名

把朴子云短狐一名蠅一名射工一名射鼯其實水中狀似

昨蟬名
鳴蜩

鳴蜩而大如三合杯有翼能飛無目而利牙云云

又云射工冬天蟄於谷間大雪時索之無魚所在其上无

モト合

ヲ

雪氣起如炊蒸當掘之不過入地一尺則得之陰干未

帶之夏天辟射工也

ナリ

小品方云射工二名短狐三名溪毒其虫形如甲虫有一長

角橫在口前如弩櫓臨其角端曲如上弩以氣為矢目

水勢以射人_ト時人或聞其在水中_{音筆}鉗_{タテマ}作聲也要須

得水沒其口_ト便能射人在無水之地便可投持_{トス}戲无

能為害也此虫從四月始生至五月_{丁子}六月其毒尚微中

人猶緩七月八月其毒大盛中人甚急入九月許有寒

露微霜者其毒向衰至十月乃息也此虫畏_シ鵞_ニ能

食之聞鵞聲便不敢來也水上流有鵞浴氣響_ニ

鵞矢毛羽流下其便走去也船行入溪宜將鵞自隨山

溪家居皆養白鵞也凡入山溪水中採伐者裝鵞屎

帶鷲之以辟之此虫刺耳而盲目凡人入溪源取水及浴
經涉渡溪者皆宜以木石達擲水中作聲其虫應聲
虛射毒便泄去也擲水法唯多過左右廣擲之虫效
毒盡然後過溪也山源之間多有此虫大雨洪潦之時
其逐水流落之人家及道上中馬跡小水中停住人
行陰地多不意悟或逐柴薪竹木來人喜不覺之
得病便作他治乃誤致死也射公中人初始證候先
寒契惡冷吹額致慈良半治卒无勸急症強頭痛目疼狀如
傷寒亦如中尸便不能語朝旦小便七文晡夕輒劇寒契

癰癰
枯病癰

悶瘡是其證也初得三四日ナリ尚可活急者七日死緩者

至二七日遠不過三七日皆死也此虫有大小ナリ者毒微

射人不即作瘡人多不知是射公毒其大者毒猛中人ナリ

乃即可成瘡耳其瘡初或如豆粒黑子或如火燒或

如蛛螫扇或痛如針刺而未見瘡處或成瘡皆完者

穿空如火針孔也其射人遠者及中人最者毒小寬ナリ

也射中人腰以上去人近者多死中人腰以下者小寬也

縱不死者皆百日乃可保老耳治之如左

治射公中人寒熱或發瘡或偏在一處有異於常ナリ

方取赤苋胡韓文合莖菜トホ搗之トホ取汁服七合日四五服良

此是苋菜之赤大者也又方單煮犀角本書作犀字飲以折

其毒契也

治射公中人方

取鬼臼又ハフ三目菜一把祀内苦酒中治欬垢濕之竟宜電契搗トホ取

汁服一升日三

又方犀屑二兩烏扇根二兩カクハヤシキ升麻三兩トリヤシキ

凡三物咬咀以水四升煮取一升半凡再服相去一炊

須盡更作

水松
狀如松而
無葉理溪
毒

又方取水菰搗取汁服一升日三即差

又方取生菜莢カラムシカニ莢一席口握之キリ新去握前後餘握ル

中火便熟搗絞以水三升煮取一升七合頓服之神効

治射中人已有瘡者方

取吳公大者ムカデ一枚小炙之搗末苦酒和傅創上良

又方取斑苗一枚火燒搗末苦酒和傅上

又方取芥子カラス搗令熟苦酒和厚塗創上半日午禽

之又方取狼牙菜ウツキ冬取根搗之令熟薄所中處又

飲四五六合汁防毒忍入內也

集驗方治射么中人瘡令人寒熱方

馬扇根二兩

升麻二兩

凡二物以水三升煮得一升過寒溫盡服之津薄上

葛氏方治射么中人方

初見此瘡便水麻犀角塗之漆復塗勿住トフル

又方急周繞去創一寸輒一灸之スクリ一處百壯創上灸

百壯

又方切葫蘆ヒル創上灸葫上ウ十壯并取常思草ナモミ搗ミ絞

汁飲二升以滓薄之

又方白鷺矢取白者二枚以少許湯和令相淹塗
枕中方治一切虫蛇射工沙虱百毒方

生胡麻搗付上吉不過三度愈

治沙虱毒方第五十一

病源論云山内水間有沙虱其虫甚細不可見人水浴

及汲水澡浴此虫著身陰雨日行草間亦著人便鑽

入皮裏初得之皮上正赤如小豆黍以手摩赤上痛如

刺過三日之後令百節疼痛寒熱赤上發瘡此虫漸

入至骨則殺人人在山澗洗浴竟巾拭如芒毛針刺

醫心方卷十八

廿二

見以竹簪オモシ挑ツクリ拂去之已深者用針挑取虫トモモウ子正如疥虫挑不得灸上三四壯則虫死云々

把朴子云有沙虱トモモウ水陸皆有其新雨後及晨暮踐

涉必著人唯日烈オモシク草蔭時著耳其大如毛駿之端初

著人便入皮裏其所在如有芒刺之狀小犯大痛可以

針挑取之ツクリ正赤如丹著ツクリ孔上行動也若不即挑之此虫

鑽ツクリ至骨便周行走人身中其病與空相ツクリ似皆教人

行有此虫之地每還所住トモモウ輒當以火自灸ツクリ燎令遍身

則此虫墮地去也若帶八物射香丸玉壘丸犀角丸等並

辟沙虱短狐也若卒不得此藥者但可帶好生麝香
二佳以雄黃大蘇合等合搗帶一丸如鷄子者念善又
可以此藥塗創念愈又咬咀赤莧根ヒユ飲之念愈

葛氏方治沙虱毒方

以大蘇オホヒユ十斤著契灰中溫之令契斷蘇ナカク及契ヒヤク以注

創上盡十斤復以艾丸灸創上七壯

又方斑苗二枚契一枚末服之燒一枚令盡烟末以
著創中立愈

又方山竹セ宜竹管盛塩シホ數視シメ體足見以塩塗之

謹要方治沙虱毒方

以麝香大蒜和搗以羊脂和香以筒中帶之大良

蘓敬本草注云煮葱莖浸或搗薄拓大効

治水毒方第五十二

病洎論云三吳已東及南諸山郡山縣有山谷溪源

處有水病春秋輒得一名中水一名溪中一名灑中灑蘓敬

一名水中病三名溪溫今人中溪本中水以其病与射工射工詐復

相似也通呼作溪病其實有異有瘡是射工而无瘡

是溪病

葛氏方云水毒初得之惡寒頭微痛目匡疼心中

爲時又云邪甚也

ホトツリ

ルクラ

許及寒熱

煩燮四支振^ナ所腰背骨節皆強^{ルクラ}兩膝疼或翕^ニ

熱但欲眠且醒^ニ暮劇手足指逆冷至肘膝上二三

日則腹中生虫食下部^ナ肛中有創不痛不痒^{カカラ}令人不

覺視之及知耳不聾治過六七日下部便膿潰^ニ

虫上食^{ヲホリ}五藏熱盛煩毒注下不禁八九日死良醫

所不能治覺得之急當視下部若有創^{ナラ}正赤如

截^{キル}完者爲毒最急若創如蚤^{ハム}更齒者爲陰毒

猶小緩要^{カナレ礼}皆教人不過廿日也欲知是中水非當作數

斗湯以トクヘ小蒜ホトケ五枚トク沮湯中莫令大契トク則無烈去滓
遍寒溫以自浴若身體發赤斑文者是也其無異
者當以他病治之治之方

取梅岩桃來搗絞飲汁三升許汁少以水解及絞之

又方常思草ナモハ搗絞飲汁一二升并以綿トメ染汁道下イレウ

部曰三

又方搗藍青クム与少水以塗頭面身體令迎千金方之

又方取菴一把トホ元煎搗以酒一升トホ元坏合和絞飲汁

若下部生創已決洞者方

桃皮棗煎イシ搗水漬令濃去滓サカ暑熱中坐自漬サカ

千金方治水毒方

搗蒼耳汁服之一升ナモ以綿沾汁シ導下部日三イナシ

集驗方治中水秘方

取水萍ササ曝乾セラシ以酒服方寸匕シ

又方搗梅棗取汁服半杯小兒不能飲傳乳飲之シ

范汪方云青龍湯治中水寒熱方

升麻二兩トリヲア龍膽一兩ヲミ萎蕤一兩ミ大青一兩ハト

凡四物吹咀以水四升煮取二升分作再服不靜復シ

鷄毛及雜毛投其中毛得直下至底者則無毒氣也
毛若倒上不下迴旋四邊者則有毒氣不可入也亦可
內生鷄鴨鵝犬羊生物置中既有毒氣其生物須
臾自死也事計必須入中不得已者當先以酒若苦酒數
斗澆灑井冢坎中邊停小時然後可入也若覓中此氣
鬱悶淹沒欲死者還取其中水數斛灑人面并水含飲
之又以灌其頭身從頭至足須臾則活也其中若無水
者乃取他水也

千金方治入井冢毒方

取他井中水灌身上至三脰項イタ活イタ若東井ナラ取西井ナラ

、取東南ナラ取北ナラ取南ナラ

葛氏方治入井及冢中遇毒氣、息奄雨邊便施方

以水灑其面并令含水又便汲其所入井若冢中水
數斛以灌之ソケ授頭至足下須臾活

又方服諸解毒犀角雄黃麝香之屬豉豆竹瀝クキ

升麻諸湯

辟瘟毒方第五十四
治中治本方作蠶豆本同く

病洎論云凡瘟有數種皆是變惑之氣也人有故造

作之多取虫蛇之類以器盛貯任其自相噉食唯ケレ一

物獨在者即名謂之為蛊便能變惑隨逐消食為ナル

人患禍ナル於他人則蛊主吉利ナリ所以不羈之徒而畜事之トモカラタケル

又云面色青黃者是蛇蛊也腹內契悶身體恒痛面色ナル

赤黃者是蜥蜴音希音易也腰背微滿舌上生瘡顏色ナル

乍白乍青腹內脹滿狀如蝦蟆是蝦蟆ナル也顏色多青毒成

吐出似蜣螂是蜣螂蛊也

又云有飛蛊來元由漸狀如鬼氣者

又云有豆蔻毒者猶是蛊類於豆蔻界域得之故謂

之豆莠毒病狀如中蠱心腹刺痛_{トク}

又云有野道者_{イフ}是無主之蠱也畜事蠱人死滅无所依止田野道路之間犯害人者故謂之野道

又云欲知是蠱與非_{トイフ}畜令病人唾水內沉者是蠱浮者_{ハナハル}

非蠱也

又云含大豆若是蠱_ナ豆皮脫若非蠱不_{ケレ}攔脫也

葛氏方云欲知蠱主姓名方

取鼓皮少燒末飲_{シヌ}病人須臾自畜_{シヌ}呼蠱主姓名

可語使呼取去即病愈_{今案權要方水飲}

又方藁荷葉密著病入卧蓆下亦即呼盡主姓名

又云治飲食中盡毒令人腹内堅痛面目青黃淋露

骨立色變無常方

雄黃丹沙梨蘆各一兩鴆莖貝以井華水服二刀圭

當吐盡毒

今案集驗方云三物各下有盡當吐不吐非盡也

又云若盡已食下部肛盡腸穿者方

以猪膽漚内中以綿深塞之

又云治中盡吐血或下血皆如爛肝方

塩一升淳苦酒一升和一服立出即愈

又方菹草根アサ子蘘荷根各三兩アサ子咀以水四升煮得
二升去滓頻服即愈又自當呼蠱主姓名菹草
即染絳菹草也

小品方治蠱方

舉樹皮シクキ廣五寸長一尺蘆葍根アサ五寸如人足オホ指
大者九二物切以水一升清酒三升煮取一升頻服當

下蠱

又方玄菟根大如母指オホ長三寸咀以酒半升漬一宿
去滓一服

集驗方治下部若蠱食入從後孔見腸方

煆墓青背長身者烏雞骨各燒作屑分等

之以吹下部孔中大良

又云治卒中蠱下血如雞肝者晝夜去石餘血四藏
悉燥唯心未毀或乃鼻破待死者方

桔梗搗下節以酒服方寸匕日三

又方隱忍根搗取汁二升分三服桔梗苗也

千金方治蠱方

柵樹北陰皮去蒼大指長寸水三升煮取一升空

腹脹之蠱虫方

又方鱧皮^{シラ}灰水服方寸匕

醫門方治蠱毒方

取巴豆一枚去心豉三粒釜底黑^{凡三}方寸匕合搗分
服一九吐虫^{即服}甚良

又方藁荷煮汁飲干溫根得用多少

樣要方療蠱毒方

水煮獨行根一二兩取汁服之吐蠱毒

救急單驗方治蠱毒方

唐
鴆藥字三枚服立驗

陳徐伯方治蠱方

取菹草生ナナシキ檮アヲチ絞取汁日可服二三升復恒取汁作

食及煮粥

僧深方治卒急タチチハ蠱吐欲死方

生索ソクソク濯若根莖檮枝ミホ取汁得一升頓服之不過再

三升作神良

范汪方治蠱方

昌蒲二兩

鴆賊イカクシラ魚骨二分

右二物搗下篩以酒服方寸匕日三

醫心方卷第六

醫心方卷第十八札記

一頁上 交接延慶本 下一 血滿延慶本 箭鏃延慶本

作 行 披打延慶本 二頁下 攀縮病源作 七頁上

鯉腸針延慶本 九頁上 螫杏螫怨焚 下二 倉創

延慶本 十二頁下 作神若唾此恐當云作若神 三

四頁上 騾驢竭騾訛 十四頁 害梨害訛 十五頁 散糞

異糞之 十六頁 集馳馳訛 下五 蘆茹散茹訛 八

仍夜病源夜 十七頁 刀刃刃訛 五行 半夏干干即

日千忍 十八頁 赤瘡赤訛 十九頁 忘取病源作

幹省 下二行 赤瘡赤訛 上八行 忘取妄取

下三 **唯趣** 延慶本趣作輒 上六行 **新錄云** 延慶本云作方 上八行

傷跌 跌訛 上九行 **禁食** 延慶本食作食 下三行 **和塗** 塗訛

上九行 **索皮細縫** 之索縫 細作線縫之或曰細

之 **縫** 之 上二行 **一滴** 滴即 下四行 **蛇尾如鉤** 四字

六 **鉤蛇** 病源鉤作响 **傷之死** 病源之下有不字 上四行 **蛇毒** 病源

千釜鑿草 白草未知然否 上八行 **即**

愈 愈即愈之草體 下四行 **螫方** 延慶本螫下有人字 上九行 **不乃** 病源無不

字 下四行 **博舛** 病源作搏 上五 **夕時** 延慶本多時 七

七行 **蝮螫** 延慶本蝮下有蛇字 上二行 **人卒** 病源卒作看 **頸背** 病源

項作

三五尺

病源作五寸

四燭尾

病源燭作燭

廿九頁

苞

之苞即

卅三頁

平伏

延慶年作平狀

卅四頁

煎寒

病源作增寒

五無適

病源無此二字

之方

病源方下有愈字

卅六頁

中馬

延慶年作

牛

卅七頁

虬螭

異構

五十一頁

猶小

猶即

下四

桃棗

延慶年作桃棗

五十二頁

小品方云

外臺引小品文異義同

五十四頁

成吐

病源成吐或

九

界城

病源城

下九

呼取去

即病愈

外臺引肘後作便即去病愈矣

五十五頁

舉樹皮

外臺引小品作鼓皮

蘆薇根

延慶年作蘆薇根注云五寸如足拇指大細

作

切本方云

五十六頁

長寸

外臺長下有五字

下五

即服

史記卷八十一

卷之十一 才言

巨解怨
或愈字

二

一七一八

醫心方卷第十九

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

斗室

篇自相連此尚平何怪矣

服石節度第一

服石及常性法第二

服石得力候第三

服石發動救解法第四

服石四時發狀第五

服石禁忌法第六

服石禁食法第七

諸丹論第八

服諸丹法第九

服丹宜食法第十

服丹禁食法第十一

服丹禁忌法第十二

服丹發熱救解法第十三

服金液丹法第十四

服金陽丹法第十五

服石鍾乳法第十六

服紅雪法第十七

服紫雪法第十八

服五石凌法第十九

服金石凌法第二十

服金汞丹法第二十一

服銀丸法第二十二

服石節度第一

服石論云中書侍郎蔣曜云凡寒食諸法服之須

明節度明節度則愈疾失節度則生病愚者不可

強^{シテ}也失身^{アヤシ}智者詳而服之審而理之曉然若秋月而

入碧潭豁然若春韶而洋溢積實^{イヘリ}謂之矣

浮字石津
字飲齋
本旨

五字以
源又字出
出字命山火又言羊
汗字語
動多端
散心
汗字
洋字

凡服五石散及鍾乳諸石丹藥等既若失節度觸
於時候皆為自忤故陶真白曰昔有人服寒食散於
古法以冷水淋身滿二百罐登時僵斃又有取汗
不汗乃於狹室中四角安火須臾即殞懷茲將息豈
不由人追之昔事守株何甚

秦華祖論云夫寒食之藥故實制作之英華群友
領袖未能騰雲飛骨練筋易髓至於輔生養壽

論語曰正牆面而立

無所トモ與レ讓シ然水所以載舟也所以覆舟散クガハル所以護命也

所以絕命ツ其有浮薄偏任之士カキシ墻面輕信カウシテ之夫苟見一

倏之トリシキ宜不度量其夷險故禍成不測ヘカレ斃不旋踵斯

藥之精微非中才之所究也ル玄晏雅材時冷廩立ハナシ溫腸ハナシ

為先藥性本一而二トホク論碩ハナシ及今之治者唯當勢トメ尋其ハナシ

斃性之本源其致斃之由善ウカラ倏其盈縮詳トリコ訴其大

剡株ト撮二家之意以病者所便為節消息ハナシ斟酌ハナシ可無ル

大過若偏執一論常守不移ラ斯膠柱而彈琴非善ハナシ

調之謂也ハナシ

五言偏云如之及漢書

許孝崇論之凡諸寒食草石藥皆有熱性發動則
令人熱便洩冷飲食冷將息故稱寒食散服藥恒
欲寒食寒飲寒衣寒卧寒將息則藥氣行而得
力若將息熱食熱飲着熱衣眠卧處熱藥氣與
熱氣相併纏結於脉中則藥勢不行發動能生諸
病不得力只言是本病發不知是藥氣使然病者
又不知是藥發動便謂他病不知救解遂致困劇然但
曾經服乳石藥人有病雅非石發要當須作帶
解石治也

其不尔多有發動不得道便恣意取煖稱適已

情為連欲以取寒凍難當時不寧於後在身多有

所益終無發動之慮也人不服石廢事不佳惡瘡

癰疥音淺溫疫瘧疾年々恒患寢食不安興居常惡非

已事錢貨散不康生子難育所以石在身中万事休泰要

不可服五石也人年卅以上ナ可服石藥若素肥充勿服

也卅以上必須服之五十以去可服三年一割六十以上兩年

可以服一割七十以上一年可服一割人五十以上精藥銷

歌服石猶得其力六十以上轉惡服石難得力所以恒
須服石令人手足溫暖骨充實髓能銷生冷奉措經便
復耐寒暑不著諸病

凡服石人甚不得雜食口味雜百品具陳終不用重食
其肉諸難既重必有相賊聚積不消遂動諸石但知
法持心將補得所石藥為益善ナク不可加

陳述之論云服草木之藥則速發須調飲食金石者則
遲起而難息其始得効者皆是草木盛也金石乃逆
引日月草木少時便息石勢猶自未盛其有病者不

解^{セトフ}消息便^{オモフ}謂^{ホカ}頃^イ休^イ續^イ後更^イ服^イ或得^イ病^イ固^イ藥^イ微^イ倍^イ復^イ

增^セ石或^セ便^セ難^セ服^セ衆^セ石非^セ一也^セ石之^セ為^セ性^セ其^セ精^セ華^セ之^セ氣^セ

則^カ合^{ナフ}五^{ナフ}行^{ナフ}乃^{ナフ}益^{ナフ}五^{ナフ}藏^{ナフ}其^{ナフ}濁^{ナフ}穢^{ナフ}便^{ナフ}同^{ナフ}灰^{ナフ}去^{ナフ}但^{ナフ}病^{ナフ}家^{ナフ}血^{ナフ}氣^{ナフ}

虛^{ナフ}少^{ナフ}不^{ナフ}能^{ナフ}宣^{ナフ}通^{ナフ}更^{ナフ}陳^{ナフ}痰^{ナフ}便^{ナフ}成^{ナフ}堅^{ナフ}積^{ナフ}若^{ナフ}其^{ナフ}精^{ナフ}華^{ナフ}氣^{ナフ}不^{ナフ}

茂^{ナフ}則^{ナフ}冷^{ナフ}如^{ナフ}冰^{ナフ}而^{ナフ}病^{ナフ}者^{ナフ}服^{ナフ}之^{ナフ}望^{ナフ}石^{ナフ}入^{ナフ}腹^{ナフ}即^{ナフ}熱^{ナフ}既^{ナフ}見^{ナフ}未^{ナフ}熱^{ナフ}服^{ナフ}之^{ナフ}

弥^{ナフ}多^{ナフ}既^{ナフ}見^{ナフ}石^{ナフ}不^{ナフ}即^{ナフ}効^{ナフ}便^{ナフ}謂^{ナフ}不^{ナフ}得^{ナフ}其^{ナフ}力^{ナフ}至^{ナフ}後^{ナフ}發^{ナフ}動^{ナフ}之^{ナフ}日^{ナフ}都^{ナフ}

不^{ナフ}自^{ナフ}疑^{ナフ}是^{ナフ}石^{ナフ}不^{ナフ}肯^{ナフ}作^{ナフ}石^{ナフ}消^{ナフ}息^{ナフ}便^{ナフ}作^{ナフ}異^{ナフ}治^{ナフ}者^{ナフ}多^{ナフ}致^{ナフ}其^{ナフ}害^{ナフ}

釋^{ナフ}慧^{ナフ}義^{ナフ}論^{ナフ}云^{ナフ}五^{ナフ}石^{ナフ}散^{ナフ}者^{ナフ}上^{ナフ}藥^{ナフ}之^{ナフ}流^{ナフ}也^{ナフ}良^{ナフ}可^{ナフ}以^{ナフ}近^{ナフ}期^{ナフ}養^{ナフ}

命^{ナフ}調^{ナフ}和^{ナフ}性^{ナフ}理^{ナフ}豈^{ナフ}直^{ナフ}治^{ナフ}病^{ナフ}命^{ナフ}已^{ナフ}哉^{ナフ}將^{ナフ}得^{ナフ}其^{ナフ}和^{ナフ}則^{ナフ}養^{ナフ}命^{ナフ}療^{ナフ}疾^{ナフ}

御失其道則爰性可ハ不慎哉此是匪者之過非藥石
之咎也且前出諸方或有不同皇甫唯歆ホ將冷稟ホ立歆
得將ト矐石藥性熱多以將冷為宜故士安所撰偏行
於世復使氏論云觀世人ハ不解ト寒食藥意而為
節度者又大誤以不解ハ後誤法安得ハ不有頓墮耶遂
不思故而其忍ハ各於藥此藥心不宜以病進時服也當
用病退時服之此藥以助心氣為主病進時則病氣強
心氣弱藥不能制也病退則曰氣強遂扶助之遂凌病
氣矣空腹及下後ハ不可服之ハ之滯暑由臬之毒積ハ歲

公對及
亂之

不解^{トケ}脹藥^{ナゲカシロ}無冬^ナ夏時^ヤ節也^ル春秋^ル老^シ為佳^ル魯國^ル孔恂^ル論云

寒食藥^{ヨシモ}治虛冷^ニ特佳^ニ然要在消息^ニ精意^{クシ}伺候^{シカヒ}乃盡藥意

稚^ニ本方云^ト極冷^ノ恣水^ニ要當^ニ以^ル解中^ニ為度^ニ若腹中不能^ル挾

心中^ニ平定^ニ未覺^ニ憤悶^ニ不可^ル便恣^ル冷飲^ニ食食^ニ為^ル燔^ニ當隨

藥熱^ニ多少^ニ衣服^ニ厚薄^ニ為^ル宜^ニ然盛冬^ニ之月^ニ可^ル燔^ニ食^ニ食^ニ後

若心中^ニ溫悶^ニ輒飲^ニ少^ニ冷水^ニ便^ル差^ニ矣^ニ如覺^ニ藥作者^ニ但薄衣^ニ行

風中^ニ為^ル解^ニ若殊^ニ不解^ニ可^ル小洗^ニ手^ニ足^ニ頭面^ニ不至^ニ浴^ニ當消息

解中^ニ慎勿^ニ逆用^ニ水也^ニ

龐氏論云^ニ夫寒食藥^ニ發多^ニ在^ニ秋^ニ冬^ニ則陽氣^ニ處^ニ內

尚書演西
漂云騰澤
本草云仁

卷之六

六

一七二九

陰氣震外、寒則熱并入助藥為熱也此其自
然茂理若有違犯藥忌復用茂消息候察唯存
心精意者也服藥人多自厭患煩憤無神不可信
取其言用加方治也當用邊人之意參之耳又藥
多違人性喜加遷怒不可慎從侍者當犯顏據爭
深守所見不可使病人甚悲用增藥動也

夫藥發皆有^ル所由或以久坐^キ久語^{モノカクシ}卧溫^シ失食^シ或以^ル御^ス
内不節^{アラ}犯損^シ弊實^シ或勞慮存^シ心情意不歡^ヒ或以飲
酒連日而不興^盛洗或以并飲^セ不消停^{ヤヤク}徐為^{ヤヤク}癖^{ヤヤク}或食餅

音ミタ久
淡澤也淡
液也

黍小豆諸熱凡此諸或皆是茂之重誡也

又藥臥欲得薄衣也宜然犯寒則無中冷之憂觸熱

則有患禍之累

諸飲食皆欲冷唯酒可溫耳諸用水皆欲得新汲井

水不欲大冷水也食欲數而不欲頓多當計一日當數

所能食分晝夜八九下後飲食猶令小溫於常食數食

之後目還如舊

衣被欲得故絮而使薄但當益領數所以尔者減益

故也若噤戰惡寒者少重其衣被以溫躰人迫捷之

赤
耻乃久熱
病也左氏
傳曰季孫
之愛我如
美赤也

禁セ不レ如解レ使遠去之過時不去便助藥發也

曹欽論云寒溫調適之宜云諸藥赤已析雖有餘熱

不復堪冷將適之宜欲得霞而不密常欲得涼而不

至於極冷譬如平人得熱欲得冬涼之大過即已為

病也故勿得脫衣露卧汗出當風也

有藥赤者若寒若熱心腹欲痛滿欲脫衣欲著衣

薄衣厚皆當隨覺為度不可輕忍也

凡服寒食散發者皆宜隨所服之人以施方治人辨氣

之不同者若云凡之殊異也雅言為當飲酒人性本有

能不雅言為當持冷人躰レ有耐寒ツフル与不耐寒雅言為

當多食飲セムト之本有思惟多湯病也多少雅言為當勞役人勸ハセム斡本

有強弱又壯充ツ与瘠瘦長老与少壯躰中扶他ハセム疾与不

扶疾耐藥与不耐藥本躰多熱与多冷凡此不可同法

而療也藥發多變モ成百病苟不精其曲折セ如以廉意

投雷ト由ル闇カ歷レ危險其趣ヲモク竄ト沛ト往ト是也

凡寒食藥發生百病者大較坐失オホムネハミ之温レ燔也乃管反今者暑

熱尤不可輕失燔温也

可疑之候玄效ミ逆咽痛鼻中窒塞フセオリ清涕出本皆是

黃帝全
難經曰
為衛
為衛

卷之十

增其衣服扶掖起行令身體汗出則榮衛津之液
則諸溫熱隨汗孔而越則不復苦煩憤矣體適津
液自不思水無事為蛇盡足而強用水若小煩躁可漬
手巾一枚拭熱處小涼則當促起還著衣矣自於藥
勢已發可徹向者始服藥重藥之衣其平常所服慎
不可減也

凡人體氣各有羸虛者恒著巾帽身籠溫裘風
惡忌冷不得臆眈如何一旦卒釋常服增以冷水
澆灌限漏刻之間則中冷矣中冷則成傷寒壯熱

如燒小大惶怖不知是傷寒也皆謂藥發身遂競沐浴空井竭泉氣力盛者有稟幸而其弱劣於是訖矣服藥之後假使頭痛壯溫面赤身熱其脉進數便當以傷寒法救之必可以桂枝發汗必可鍼灸無所拘疑也

潘師房救解法云凡石一度發即一倍得力如不發者此名無益若一發後更無諸病有病必是石發也

皇甫謐節度論云吾觀諸服寒食藥者咸言石藥沉滯凝著五藏故積歲不除草藥輕淺浮在皮膚故解散不久其違錯草石正等今之失度者石尚遲緩草多

急疾而今人利草憚石者良有以也石必三旬草
以日決如其不便草可悔止石不得休故也然人有服
草散兩十年不除者有服石八兩終身不發者雖
人性有能否論藥急緩無以異也

又發動救解法云人將藥但知寒用藥得水藥得大益
不知寒益動所以因不解者由是失和故也寒大過
致藥動者以煖解之熱大過致藥動者以冷解之
常識所由也無不得解

又云服寒食散者准以數下為急有解終不下之必不

得生イノシ下シ後當慎ツツシム如節度

又云服シ散不可失食即動常令胃中有穀シメヨ強則體
氣シ勝シ則藥不損セ人不可廉食藥益ナセヨ常欲得マフ養
食シ肥猪獲脂肥脆者為善

又云河東裴秀シ疾服藥失度而憂ニ三公之尊イナリ已錯アヤ之後
已不復自知シ左右又不解トキ救之ニ法但飲冷酒冷水洗
之用水數百石寒益甚ツル遂絕命於水中良可悼也イナム

夫以十石シカ堆炭ツカシ二百斛水オコセリ浚イシ之則炭滅ヤチム矣藥熱氣ヤチム稚
甚シ未如十石之火也浚イル之不已ヤテ寒足ヤテ致人何悲於藥乎ヤ

世之失救者寧多如此歟服此藥者不唯已自知也

家人大小皆宜習之使熟解其法乃可用相救耳

又云凡有寒食藥者雜素聰明發昏頑冥告喻難曉

也以此死者不可勝計急飲三黃湯下之得大下即差

服石及常性法第二

皇甫謐云凡治寒食藥者雜治得差終不可以治者為

愚也非得治人後忘得効也昔文執事治魯王病先使王

怒而後治病已王不思其愈而思其怒又執以是雜愈

王病而終為王所殺今救寒食藥者要當逆常理及心

性犯怒以治之（ル）自非違者（ル）已（イ）老之後（イ）心念犯怒之（ル）死必
忌得治之恩（ル）猶（ユ）吝主之教（ル）又（ユ）摯也（ル）后与太子尚不能救
而况凡人哉（ヤ）然死生大事也（ル）知可生而不救之（ル）非仁
者唯仁者心不已（ヤ）为冒怒而治之（ル）为親戚之故（ル）不但其
一人而已（ノ）凡此諸救皆吾所親更也（ル）已試之（ル）驗（ル）不借問於
他人也（ル）大要違人理（ル）及常性（ル）

六反

重衣更寒（下）反

外臺方云凡人寒重衣即暖服不人宜薄衣若重衣更寒經云熱極生寒故云反

飢則生臭（二）反

平人飽則食不消化生食氣服石人忍飢失食即有生臭氣与常人不同故云二反

胃心方氏トシ

逐則自勞三反

平人有所疲極即須消息恬養服石人久坐卧瘕極難須自勞適散石氣即得宣散故云三反

溫則泄利四反

平人曰冷乃利得暖便愈服石人溫則泄利冷則差故云四反

飲食欲寒五反

平人食溫暖則五內調和服石人飲食欲寒乃得平穩故云五反

癰瘡水洗六反

七急

當洗勿失時一急

當食勿飢二急

酒清淳冷溫三急
衣溫便脫四急

食必極冷五急

卧必底薄六急
食不厭多七急

八不可

冬寒欲火不可

飲食欲得熱二不可

常疾自疑三不可

石人

常頃消息シ節度ヲ竟ニ以テ不レ要ニ將ニ息ヲ
依法治不可生ハ執ヲ疑ヲ

畏避風溫四不可ル
若覺頭風熱悶憤心煩則宜常當風梳頭以水洗手面即好不此尋常風溫

極不能行五不可ル
若久坐卧有所疲極者須行促自勞

飲食畏多六不可ル
居貪厚席七不可
所欲從意八不可ル

三無疑

勢連常理一無疑ル
委心棄本二無疑
寢處必寒三無疑ル

若能順六及從七急審八不可定三無疑ル
雅不能終蠲

此疾浸齒無患者庶可以釋朝夕之暴卒矣

服石得力候第三

醫方卷下

病源論云夫散脉或洪實或新絕不足欲似死脉或細

數或弦駛坐所犯非一故也脉無常度枵醫不能識然契

多則弦駛有濇則洪實急痛則新絕沉數者難發

浮大者易發難發令不人覺藥勢行已藥但於內

茂才不出形於外欲候知其得力人進食多是

一候氣下顏色和悅是二候頭面身瘡是三候

策々惡風是四候厭々欲寐是五候也

服石發動救解法第四

皇甫謐蔭侍郎寒食藥發動證候四十二變并

消息救解法

今檢有五十一變

皇甫謐云寒食藥得節度者一月輒解或二十日解解堪溫不堪寒即已解之候也

其失節度者或頭痛欲裂坐服藥食溫作瀉

急宜下之

或兩目欲脫坐犯熱在肝速下之將冷自止

或腰痛欲折坐衣厚體溫以冷水洗冷

石熨之

或眩暈欲蹶坐衣溫犯熱宜科頭冷洗之

胃心方卷下

十三

薛公云常須單床行役并以冷水洗浴（七九）

即愈（七九）

或目痛如刺寸熱氣冒肝上奔兩眼故也勲於

冷食清旦以溫小便洗之（七九）

或目冥無所見坐飲食居處溫故也脫衣自（ス）

勞洗促冷飲食須臾自明了（九）

或罌面目皆浮腫坐食飲溫又不自勞藥与

正氣障并故也飲熱酒冷食自勞（七九）冷洗之則暑

或耳鳴如風聲汁出坐自勞出力過（九）暑房

室不節氣并奔耳故也アヲ懃ミ好飲ヨク食稍セヨ行步

數食ル節情ル即心

（大亂及不成子日）

或鼻中作殒（殒大亂及不成子日）鷄子曼坐（曼小曼也）暑衣溫故也脫衣

冷洗即止（冷小冷也）或本云冷洗薄衣即差或口腹

傷舌強爛（ルクムタシカイ）燥不得食坐食少穀氣不足

藥積胃管中故也急作支子豉湯（支子字）脹三

刮差或本云二刮差矣（今案支子豉湯在茅二十卷口干方）

或斷腫脣爛（ハレシ）齒牙搖痛（キ）頰車禁坐（ツラカチハツブカ）犯熱不

時救故也當風張口（ヤフ）使冷氣入咽（イ）漱寒水即差（クナレハ）

胃心方底上乙

一〇

或咽中痛鼻塞清涕出坐溫衣近火故也促
脱衣冷水洗當風以冷石熨咽類五六過自
美或存云脱衣取冷當風立以冷物熨咽
須臾愈不須洗

或欬逆咽中傷清血出坐卧溫故也或食溫故也飲
冷水冷石熨咽外

或偏臂脚急痛坐久藉卧席溫不自轉移熱氣入
肌附骨故也懃以布巾冷水淹迫之溫復易之

或兩腋下爛辛痛坐臂脇相親故也以物懸手離

脇冷石熨之

或胃脇滿氣送切字干坐切字飢而不食切字壅氣薰切字其故

也但冷食冷飲冷洗即差

或手足偏痛諸節欲解身體發癱瘡切字堅結坐寢

憂久不自移迭暴契併聚在一處或堅結核痛切字

甚者發癱始覺便以冷水洗冷石熨之切字微者食

頃消散劇者日用水不絕乃差洗之切字元限要差為

期切字葦公云若躄上生瘡結氣腫痛不得動者為

自勞大過也

...

或腹脹欲決セムト甚者折衣帶坐寢處久下熱又衣溫失

食失洗不赴行促赴行飲熱酒ルアヤカニ冷食シ冷洗シ當風櫛以

梳而立ツチシ

或腰痛欲折坐衣厚ク躰溫ナニ以冷水洗シ石廩之ヲ蔭公

日若腰痛欲折雨目欲脫ヌケム者為熱上肝シ蔭腰腎冷

搔故也シル

或脚疼欲折坐久坐ヒルム下溫モトナニ宜常坐シ寒床以冷水洗シ

行或本云常須單床モトナニ上坐マツ善也シ

或脚指間生瘡坐著履故也脫履ハ著屐ハ以冷水洗シ足

則差薛公云當以脚踐冷地以冷水洗足則差

或肌皮堅如木石枯不可得屈坐食熱卧温作癖久不仁音区之支宿食未消

下五藏障閉血脉不周通故也促下之冷食飲熱酒促下也

自勞行即差力

或身皮或本云身肉楚痛轉移不在一處如風狀或力

本云如似遊風坐犯熱所為非真風也冷洗冷熨力

即了矣アキヲカナリ

了者是意
然病陰神
明之也
狀也

或百節酸痛坐卧下太厚又入温被中又衣温不脱力

故也卧下當極薄太要也被當單布不着綿衣之當薄力

要當心分長トシ

ト二

且垢故勿レ著新衣直ル著故絮也フキモタ雖冬寒フケル當常裯頭受アヘシ風以冷石熨衣帶初ノ不得繫也カニシ若犯此酸悶者促入冷水浴勿忍病而畏浴也オシ

或關節強直セ不可屈申坐久停息不自煩勞アセ藥氣勝セ正氣結而不散越セ沉滯於平脉中故也ト任力自溫便冷洗即差任力ト自溫者ト令行動出力足タスル芳則發溫也アラシ非厚衣近火之溫也ニシモ

或脉洪實オホキ或新絕不足ニ似欲死脉或細數強駛坐所犯非一故也脉無常シ投醫モ不能識別也シ熱多則弦駛有

駛シ疾也ハ

變

癰則洪實急痛則斯絕凡寒食藥勢率常如此唯

勤從節度耳

或人已困而脈不絕坐藥氣感行於百脈之中人實氣

已盡唯有藥兩猶獨行故不絕非生氣也已死之後

體故溫如人肌腹中雷鳴顏色不變一拜宿乃似

死人耳或冬之尋死或不死坐藥氣有輕重之故有

死者輕故有生者難矣得生非已疾之法遂當

作禍尤宜慎之大有此比故也

或心痛如錐刺坐當食而不食當洗而不洗寒熱相

尋心方表下也

下二

絞氣結不通結在口中葉不得息當校口促与熱

涌任本性多少其令涌雨行氣自通得噫日冷水

洗淹有布巾著所苦要温復易之自解便速冷食能

多益善若太惡着衣小使温便去衣即差於諸痛

之中心痛最為急者救之若赴湯火乃可活耳

或有氣断絕不知人時頻口不可開病者不自知當

須傍人救之要以熱涌為性命之本不得下者當楮

去齒以熱涌灌冷之口中塞送涌入復還出者但与

勿心也也腹内之如此或半日涌下氣通乃獲活不

厥小品此
字

熱小品此字

都角多擊
推也

下者便教人也

フハル 小元此字

或服藥心中悶亂坐服藥溫藥與疾爭結故也法當

大吐下不吐下當死若不吐下不絕者冷食飲自解

薛公曰若絕不識人目復不開者急當極齒以熱酒灌

之入咽吐者更當與之得酒氣下通不過半日蘇

笑

廣雅勝
脫胖者
龍云胖
勝

或淋不得小便坐久坐下溫及騎馬鞍中熱勝脫故

也
勝中水府

也大冷食以冷水洗少腹以冷石熨一日即愈

或小便稠數坐熱食及取諸含熱物餅黍之屬

學問心方集下し

故也或本云餅黍羊酪之屬以冷水洗小腹自不著

者冷水浸陰又佳若腹不解脹支子湯即解

或蔭囊臭爛坐席厚下墊故也坐冷水中即著

或大行難腹中堅固如地盤坐犯溫久積腹中乾糞

不去故也消蘓若膏使寒脹二三升浸潤則下不下

更服下藥即著葦公曰不下服大黃朴消等下之

即著

或大便稠數坐冬節度將死之候也如此難治

矣為可與湯下之僅十得一生可不與湯必死莫畏

不ラモ與也下目已ハ鼓死ハ令人シ不ラ恨

或下痢ハ如中寒ハ坐行ハ心ハ食飲ハ犯ハ契ハ所致ハ人多ハ疑ハ是

本疾ハ又有滯ハ痺者ハ皆犯ハ契ハ所ハ為ハ慎ハ勿ハ疑ハ也速脫衣ハ

冷食ハ冷飲ハ冷洗ハ之

或遺糞ハ不自覺ハ坐ハ久下ハ溫熱氣ハ上入胃ハ小腹ハ不ハ禁

故也冷洗即心

或失氣ハ不可禁ハ心坐ハ犯ハ燭ハ石ハ特洗ハ故也冷洗ハ自寒ハ即

或周髀患腫ハ不能自轉ハ從坐ハ久停息ハ不飲酒ハ藥氣

沉在皮膚ハ之內ハ而血脈ハ不通ハ故也飲酒ハ冷洗ハ自勞ハ行步ハ

即差極不能行者使健人扶曳之壯事速意慎
勿聽從之使支節柔調乃心勿令過差過則便極
更為失度熱者復洗或本云飲熱酒冷水洗

或嗜眠不能自覺坐久坐熱悶故也急起冷洗浴也
食飲自精了或有癖也當俟所宜下之

或夜不得眠坐食少熱氣在內故也當服支子湯數
進冷食葦公曰當服大黃也支子三黃湯數進

冷食自得睡也今案此湯在弟廿卷除熱解發篇

或夢驚悸不自制坐熱在內爭五邪干錯与藥相

犯食^ア之目^イ也

或得傷寒或得溫瘧坐犯^シ熱所為也凡嘗服寒食

雖^モ以久解^{トク}而病^ミ痛者要^{ナラ}先^カ以寒食救^フ之終不中^ハ冷也若

得傷寒溫瘧者^ク亦可以常藥治之無咎也但不當飲

熱藥耳傷寒藥皆除熱瘧藥皆除癖不^レ與寒食

相妨故可服也

或^シ於戰患寒如傷寒或發熱如溫瘧坐失食忍飢失

洗^ハ久坐不行或食^ク夏穢故也急^ニ於洗起行^ハ

或寒慄頭掉不自^セ支任坐食少藥力行^ハ於肌膚五藏

皆^ハ心^ハ分^ハ失^ハト^ハ

ト

失守百脉搖動与心氣爭競故也努力強飲熱酒以和
其脉強食冷飲以定其藏強起行以調其關節酒
行食充開機已調則洗了矣云了者是慧坐病除神
明了然之狀也薛公曰強洗以宣其擁滯

或脫衣便寒暑衣便熱坐脫著之間無適故也當小
寒可著小熱便脫即心洗之則慧矣慎勿忍使病茂
也薛公曰應洗忍之則病成也

或寒熱累月張口大呼眼視高精候不与人相當用
水百餘石澆洗不解者坐不能自勞又飲冷酒腹食

媼五胡多反
靜好也
且明白

然了也

溫故也其故及中熱也譬如喝人乃心下更寒以冷救之愈劇者氣結成冰得熱熨飲熱湯冰消氣散喝人乃心解令藥熱聚心乃更寒戰栗如喝之類也速與熱酒寒解氣

中寒受涼
廢也

或藥發輒屏卧不以語人坐熱氣盛食少穀氣不

充耶ミタ干シカレ心性故也飲熱酒冷洗食自勞便佳シ

或食下便吐不得安住坐有癖促下之セ葦公曰急以甘

草飲下之セ

一七五九

ト一

或患冷食不可下坐久冷食口中不知味故也

可作白消糜益著襦熱食一兩過悶者還冷飲

冷食也

或惡食如臭物坐溫衣作癖也當急下之若不下方救

終不差也薛公曰以三黃湯下之

今案三黃湯方在茅甘卷勢除解發条

或飲酒不解食不得下乍寒乍熱不洗便熱洗復寒

甚者數十日輕者數日晝夜不得寐愁悲恚怒自驚跳悸

恐芒惣忌誤者坐犯溫積久寢處失節食熱作癖內實

使熱與藥并行寒熱交爭難以法救之終不可解也吾

癰疽
小兒病

嘗如此勤對食垂涕援刀欲自刺未及得施賴外親見

迫秦故事不行退而自惟乃却刀強食飲冷水遂

亡禍不得成若絲髮矣

龐氏論云凡藥欲發之候先欲頻申或若頭痛目疼

身幹癩癢或驚恐悸動周身而強或耳中氣滿如碎

車之聲或幹熱劇於火燒或如針刺禁燥惡寒味

憤不知病處或腹中燠熱如燒鍛缺懷之也此皆欲

發之候也其發甚者腹滿堅於材石繞口青黑大小便

血而多無脉也唯氣息裁通心下溫耳如此之病歸於

胃

十一

大澆以老為期也

又藥盛發使人悲愁志怒角弓反倒其狀若風有面

色青黑身躰斑璘シ瘡今時當極大澆用水無數カルベシ如草

草多用水二三石ナホシ尔乃解得解之後トクランア當速下ル凡浴

之初皆多惡冷ニクム但得水數斛漸逐便之心意慄然則止

若腹中懊悶陶熱シ者若渴人精神カ累ヲ但欲眠卧セム

者此藥發在內政守五藏也急服七物支子湯外以新

汲冷水浴之タム
今案在弟廿卷除契解發
篇出小品方號黃芩湯

若禁濕振疥極目勞動病人不能自勞者車載ハセ或

牽挽ハキヒ掣ハキ頻カク之ナリ

若ハ禁戰者復如上牽挽之若ハ大行通利无他結寒又周體无有熱溫之證而平氣悖モウイフ須臾不能言者速溫好酒三升稍飲之熱悶者飲水則解ナ

若ハ大行小難腹微滿氣急復苦渴患此之後尋復舌大不得語者速飲艾子湯

若藥發不時解而久苦渴是多澀飲所為也若下而故イナラシム老耳ホシ

葛稚川云凡服五石護命更生及鍾乳寒食諸散失將ル

和藟度皆鼓發動其病無所不為若發越倉卒不漸
而至者此皆是散熱也宜時救解

若四支身外有諸一切疾痛連常者皆以冷水洗數
百過熱有所衡水漬布巾隨以橋之又水漬冷石以
熨之行飲暖酒逍遙起行

若心腹內有諸一切疾痛連常煩悶惛悅者急解衣
取冷熱溫酒飲一二升漸稍進覺小寬便冷食其心
痛者最急

若肉冷口已噤但折齒下熱酒便開

若腹内有結^リ緊^{ナセ}熱^{ナセ}。溼^{ナセ}便^{ナセ}生^{ナセ}衆^{ナセ}疾^{ナセ}者^{ナセ}急^{ナセ}下^{ナセ}之^{ナセ}熱^{ナセ}甚^{ナセ}口
發^{ナセ}瘡^{ナセ}者^{ナセ}下^{ナセ}之^{ナセ}癖^{ナセ}實^{ナセ}猶^{ナセ}不^{ナセ}消^{ナセ}惡^{ナセ}食^{ナセ}畏^{ナセ}冷^{ナセ}者^{ナセ}更^{ナセ}下^{ナセ}之^{ナセ}
夏^{ナセ}使^{ナセ}氏^{ナセ}論^{ナセ}云^{ナセ}其^{ナセ}察^{ナセ}腑^{ナセ}中^{ナセ}有^{ナセ}不^{ナセ}常^{ナセ}皆^{ナセ}是^{ナセ}藥^{ナセ}氣^{ナセ}服^{ナセ}藥^{ナセ}
時^{ナセ}須^{ナセ}察^{ナセ}所^{ナセ}患^{ナセ}或^{ナセ}小^{ナセ}著^{ナセ}寒^{ナセ}或^{ナセ}心^{ナセ}中^{ナセ}溫^{ナセ}或^{ナセ}心^{ナセ}中^{ナセ}溫^{ナセ}或^{ナセ}寒^{ナセ}或^{ナセ}熱^{ナセ}或^{ナセ}痛^{ナセ}
或^{ナセ}瘡^{ナセ}或^{ナセ}緩^{ナセ}或^{ナセ}急^{ナセ}或^{ナセ}眩^{ナセ}或^{ナセ}痺^{ナセ}或^{ナセ}理^{ナセ}或^{ナセ}亂^{ナセ}其^{ナセ}有^{ナセ}所^{ナセ}覺^{ナセ}皆^{ナセ}是^{ナセ}
藥^{ナセ}也^{ナセ}心^{ナセ}中^{ナセ}溫^{ナセ}或^{ナセ}小^{ナセ}飲^{ナセ}冷^{ナセ}水^{ナセ}不^{ナセ}解^{ナセ}漸^{ナセ}益^{ナセ}裁^{ナセ}解^{ナセ}便^{ナセ}云^{ナセ}又^{ナセ}諸^{ナセ}所^{ナセ}
覺^{ナセ}未^{ナセ}必^{ナセ}周^{ナセ}躰^{ナセ}或^{ナセ}茂^{ナセ}頭^{ナセ}面^{ナセ}手^{ナセ}足^{ナセ}背^{ナセ}隨^{ナセ}所^{ナセ}覺^{ナセ}處^{ナセ}以^{ナセ}濕^{ナセ}
手^{ナセ}巾^{ナセ}熨^{ナセ}之^{ナセ}不^{ナセ}解^{ナセ}小^{ナセ}洗^{ナセ}之^{ナセ}則^{ナセ}解^{ナセ}即^{ナセ}心^{ナセ}
曹^{ナセ}欽^{ナセ}救^{ナセ}解^{ナセ}法^{ナセ}云^{ナセ}有^{ナセ}藥^{ナセ}痰^{ナセ}而^{ナセ}苦^{ナセ}頭^{ナセ}痛^{ナセ}目^{ナセ}冥^{ナセ}惡^{ナセ}食^{ナセ}下^{ナセ}

便吐不得安者為是滯實也九ハテ當促下之九ハテ若頭痛目疾

而不思食者自是寒食散疾未必純是滯實也九ハテ宜

當急以將冷為治又ル若有滯實也不下終不差也寒食

藥又ル率致藥熱服下藥要當以能否下為度不得病

可重下也期以得病為斷服藥未下慎勿飲酒也セトシホスル

令人悶吐下後食少裏空熱便乘虛在裏則吐又ル

送下利腹滿如此者宜以冷食漸之解服セソ文子湯是

其治也今案此湯在茅女卷号増損

藥發頭面若眩冒者則解頭結散髮扇之若雅覺差又ル

皇甫文子致陽出小品方セソ

猶不愼^ル者沐頭其熱甚^{シク}頭痛面赤者以寒水淋頭暑^シ熱時以冰水淋頭不^レ差^イ以油囊盛冰著^シ頭結中覺^ル差^オ下水^セ

藥發耳目口齒苦耳鳴汁出數^ニ冷食稍^シ步行鼻^セ口^ク鼻^ニ飲^シ冷^シ洗^シ口中生瘡舌強^シ服^シ艾子湯^ヲ

藥發心腹苦心腹痛者當^ニ熨^フ口^ニ禁^ム者^ノ楸口^ヲ促^シ與^テ用^フ冷水淹^ヒ手巾著^キ苦處^ニ溫^ム腹^ヲ易^シ

諸痛之中心痛最急救之若赴湯火或有氣絕病者不自知當^ニ須^ル邊^ニ人^ノ之救^ヲ以^テ酒灌^グ冷^シ之^ヲ咽^ニ中塞^ム送^リ酒^ヲ入^ル輒^ニ還^ル

醫心方卷之乙

トニ

勿心也出腹内之

本草云腹水石名寒

腹滿者服腹水石湯胃心腹中熱盛咽乾口燥飲冷

霍乱吐逆當用飲冷胃中室寒胃脅痛強當飲溫

腹中拘急切痛當用飲食不宜但以冷迫之也腰痛

以寒水洗冷石熨之太行難消蘓令如膏服三升則下未下重服之小行稠數者以水洗小腹服支子湯則

差

藥發四支若手足煩熱心閉者以冷石熨其者以水

熨之開節不屈申百節酸疼者熱自勞役溫則澡洗

藥發禁寒有藥灰者ラ雅當澡カ之セ若早藥熱禁不セ

得出令禁寒急用飲酒熱自勞役セ即當新溫矣新者新理也若晚オソク

藥熱並憤シ令シ人禁寒先用飲酒セ氣頗行使用シ

澆灌之當漸溫矣常當數食アテケテ一日可至十食失食令人

苦寒

藥發雜患モトメ其有偏痛偏煩偏冷偏熱偏急偏緩皆偏シ

洗之當於水下覺除也オホエ若有腫核者宜以冷石熨ヲ不

差宜以冰熨之

釋慧義薩侍郎浴熨救解法云凡藥石發宜浴セ

藥石發宜浴

米一升

食肉多發シ如上法服セ數不解ル又服セ蔞子末トケ不解ル又服セ支

子豉湯

食生菜發セ服甘草湯 食糜米發セ服甘草湯 糜米謂粗穀不精也

大飽食發セ如上服甘草湯失食飢發セ服葱白豉湯

醉發セ服葱白豉湯若不解服理中湯

瞋怒大過發セ服人參湯

將冷大過發則多壯熱ク先以冷水七八升洗浴然後用

生薑湯五六石灌之灌已食少暖食飲少執酒行步

自勞則解若不解復服支子湯

將熱大過發則少心悶服黃芩湯

今案之上湯方在
後卷

薩侍郎補餌法云服石之後一二百日内須喫精細飲

食養酒等使血脈通利

若覺虛憊任餌署預餌飢強筋骨及心渴

若覺大熱者可服紫雪或金石凌或絳雪或白雪等

此等救急紫雪為上如不得
通洩宜服黃芩飲快利即差

若覺體氣懣懣不痛不痒小便赤澀即絞第根往

服之

楊氏遺秘抄
云餌法
博記二百字
見玉篇

本草云
鄭真

若口干即校變甘蔗汁但服若不下食服三物生薑煎

若不下食體弱之氣力即須食鮮鄭上贈フナカミ

若發瘡及腫但服五香連翹湯等忌菓猪蘇生菜等

今案五香連翹湯在
小品第十治惡核方

鐵

若腫有根堅如織石帶赤色者服湯仍以小艾炷ヤシモ

當腫上灸之一兩炷為佳

初陽功曹范曲論云今方云憤イタカハシク煩イタカハシク或痺便浴之人セヨ

羸不堪大洗浴者當隨藥動處極洗之非藥動處ルハ

則堪水若周身浴不寒特便水者當特洗之若腹背タラリナラハ

聖方

七

不便水處可濕手巾看上熅則易可着半袖去衲襦セシ

不熹令腹煖ユラアシム應華單薄被則可矣アタカナラ雅當ホト食飲得ス

新炊飯カシク冷ヒヤシ汝之イモ若不能輒炊先以熱湯澆飯令釋乃冷ヒヤシ

汝之有ル堅積カタアル疥先服消石大丸下之セ乃服散人多ムカシ屢ル

瘦下之可畏ヤセオツル今葉消石大丸有ル第十癰瘰瘵

服石四時菰狀第五ル

皇甫謐救解法云春菰送冷復菰短氣秋菰檢痒痒遭及

冬菰寒戰

此四時菰動變易無常諸所為病乃至ル万端或動身解

四支痠^{ヤウヤシ}強^リ難^リ於^ニ屈^シ申^シ或^レ胃^シ腸^シ脹^シ滿^シ但^レ欲^ス于^ニ飲^ス或^レ食^ス而^レ少^シ氣^シ
不^レ欲^ス語^ス言^ハ或^レ睡^ル眠^ル但^レ常^ニ欲^ス卧^ス或^レ危^シ苦^ク寒^シ思^フ欲^ス厚^ク衣^ス諸^レ
如^キ此^ノ候^ニ藥^ヲ將^ス大^ニ發^ス宜^シ忌^ス解^ス事^ヲ在^リ汗^ニ出^ル動^ス作^ス飲^ス酒^ヲ養^フ食^ヲ
為^ス法^ヲ

或^レ頭^ニ痛^ム目^ニ不^レ欲^ス視^ス或^レ腹^ニ中^ニ雷^ヲ鳴^ス大^ニ小^ニ便^ス數^ニ或^レ解^ス隱^ニ軋^ス狀^ヲ如^シ
風^ノ搔^ル或^レ淫^ニ策^ヲ如^シ針^ニ刺^ス或^レ有^ル熱^ヲ刺^ス乍^ニ來^ニ乍^ニ去^ス或^レ咽^ニ隻^ヲ
壹^ニ寒^ニ有^ル如^シ傷^ニ寒^ニ或^レ鼻^ニ中^ニ蕭^ニ條^ニ若^シ有^ル風^ノ吹^ス諸^ノ如^キ此^ノ者^ヲ
皆^ニ是^ニ將^ス發^ス之^ノ候^ニ宜^シ速^ニ起^ス行^ス解^ス衣^ヲ向^ニ風^ニ便^ス自^ニ解^ス
或^レ苦^ク寒^ニ禁^ス戰^ス如^シ傷^ニ寒^ニ者^ヲ當^ニ飲^ス熱^ヲ酒^ヲ隨^フ人^ノ能^ス不^レ先^ニ以^テ煖^ス

湯ハル小洗頭面手足行步自動作セ使體中熱セシメ以手巾漬ヒタシ

冷水摩拭之良ハルヲユエ

或腹中雷如鳥飲冷水一升若飢可食食薄衣腕巾ヌケ

胃氈褌諸及毛席也
布蜀及

或但苦熱悶而腹滿心痛者宜飲熱酒冷水洗還シモ

薄衣小暖熱氣自心ヤタハカナル
ヤム

或患腹背熱ハル如手如杯チヲ如盤クナラ許者以冷石随熱處アハシ慰

即差上

或頭痛項強ハナシ兩目疼而悶乱セハ者便以水洗浴ヒ即差上

法淵集卷一
服石禁忌第六

薛曜論云夫金石之性堅耐而急烈又性清淨而

滓惡穢

皇甫謐云凡諸石士十忌

第一忌瞋怒第二忌愁憂第三忌哭泣第四忌忍便

第五忌忍飢第六忌忍渴第七忌忍熱第八忌忍寒

第九忌忍過用力第十忌安坐不動

若犯前件忌藥勢不行偏有聚結常自安穩調和

四弊之不得苦讀念慮但能如是終不發動切即愈

醫心方卷下乙

廿

曹欽論云凡藥疾禁忘者第一不宜悲思柴泣其次不

甚宜出筋力已自勞侵不宜觸盛日猛不宜甚噴恚憂

忌不宜熱衣熱食不宜服熱藥針灸不宜食餅黍羹

臙羊酪皆含熱故恚不宜食之

龐氏論云諸脉凡九草木石散者皆不可灸針身體令人

善哉ヘウソ疽瘡也

服石禁食第七

耆婆方云服石後不可食諸物十種

油
貽藥
蕪荳芥子及菜
薺
蔞
桃竹笋
薺
蔓菁葵

茶署ヤブノイモ預

又云凡諸服石士不得多進麴及諸餅餌生菜五辛五菓
黍肥羊不得多食也

又云壓下石諸物十三種

蕎麥粟米ソテウキ淡竹オホタイ筍シノケ水芹セリ乾苔木耳ノコギリ柑子冬荻芋ノコギリ

龍葵コナヒ菰菜コナヒ鹿角菜ツノアタ猪

諸丹論第八

服石論云凡諸丹皆是衆石之精論其切効切力シ可シ活シ生シ按シ
死人亦有知之品有不知之者然知者至少不知之者極多

醫心方卷下乙

廿一

修^シ交^カ狂^{キヤウ}之^ノ徒^ト則^{スレバ}巧^{カウ}磨^モ不^レ能^ズ計^ス其^ノ頭^{カウ}數^ス故^ニ至^ル人^ノ以^テ寶^{ホウ}
愛^{アイ}庸^{ユウ}夫^フ以^テ之^ヲ輕^{カウ}賤^{セン}則^{スレバ}壽^{イフチ}促^ス寶^{ホウ}愛^{アイ}則^{スレバ}命^ノ延^{ノブ}人^ノ皆^ハ重^シ
其^ノ逆^{ノブ}命^ノ而^{シテ}不^レ解^セ逆^セ其^ノ命^ノ貴^{トク}駐^ル其^ノ年^ノ而^{シテ}不^レ知^ズ駐^ル其^ノ年^ノ是^レ
可^シ歎^ス者^ノ也^{ナリ}余^ヨ及^テ少^シ年^ノ已^ニ來^{タリ}常^ニ好^ム事^ヲ每^ニ以^テ諸^ノ小^シ丹^ヲ救^フ疾^ヲ
久^シ而^{シテ}愈^ヘ其^ノ七^ニ八^ニ其^ノ九^ニ十^ニ暴^ニ之^ヲ屬^{トモ}今^ニ有^リ氣^ヲ已^ニ盡^ス而^{シテ}藥^ヲ入^ル口^ニ須^ニ
臾^ニ即^チ活^ス者^ノ今^ニ有^リ氣^ヲ未^ダ絕^ス而^{シテ}藥^ヲ入^ル口^ニ少^シ時^ヲ直^ニ老^ス者^ノ今^ニ有^リ年^ヲ
日^ヲ始^ニ慮^ス者^ノ亦^ハ有^リ終^ニ朝^ヲ如^シ愈^ヘ者^ノ大^ニ都^ニ神^ノ効^ヲ之^ヲ功^ヲ語^ル之^ヲ難^シ盡^ス
自^レ斯^ニ已^ニ後^ニ但^ハ有^リ得^ル此^ノ方^ヲ及^テ有^リ過^ス此^ノ藥^ヲ者^ノ咸^ニ勿^シ起^ス謗^ヲ心^ヲ但^ハ
生^{ナセ}信^ニ意^ヲ則^チ必^ズ無^シ橫^ニ死^ス之^ノ慮^ヲ也^{ナリ}

諸丹服法第九

服石論云凡服丹之躰必須令其病者正意深信不
得於中持疑更懷他念但想其藥入口即愈慎勿起不信
心其用丹之人必須一心願病立差

凡有病服丹者必須去其疑惑起其信心想其丹入
口消病狀如沸湯之汶冰雪若此信者無不立愈

凡服丹先首於吉日清且具服嚴飭淨願其口面冥立
再拜一心茲願服神藥已後千殃散滅百病消除志求
長生無違其願一切太聖加護去老還年茲此願已

又以淨水ルイ頼口先含一棗核セネ許蜜次且以二三服之若

無所覺觸者至他日又漸增之以微覺觸為度セロ

凡服丹ル有先熟爵半果許棗後以丹和咽之者有

和蜜吞之者ル有以白飲及酒送之者ル有直示引口

中津沟并以水下者此等並得無在ル

凡有病与丹相應者但著起首一二服ル縱不得全除即

覺病熱漸損如此者宜服之勿ナカルヘシ若已經三三服後不

覺有異者即知藥病永背不宜更將服之セロ

凡服丹皆須晚食ル必須少不得過多ル則令藥勢不

治
二及水名
二及水名

行所以須^{コトニ}少^{モチ}則易通^ニ則疾得藥力

凡服丹者皆須調和神性不得^ル下喜^{アル}下瞋^ル則令氣脉

痿^{フヒチ}寒^{フセカシム}

呂氏丹方云凡人有老有少有強有弱有虛有實有肥

有瘦質既有異性^{コトシ}必不同^ニ服一藥其間則有多者^ニ

有少者^ニ有服一二丸須臾即效者^ニ有服三四丸久之

始效者^ニ有服五六丸少時便效者^ニ有服十九丸已來遂

竟不效者^ニ為此皆須從少至多不得從多至少但以斯

法調節度無失其理者

服丹宜食法第十

大清經大一神精丹方云凡服丹人得食粳米梁米粟

米粥葱豉粥等及苜蓿モロコシ夢青葱ミナソウ日韭菜生薑荻薤

薤豉羊鹿獐雉菴アヲ少シ續等ニイ煮ホシナリ及脯ホシナリ並得食其羊肉ニイ唯

得作脯食ナシ不宜ナシ伴ナシ羹食ナシ也

服丹禁食法第十一

呂魂丹方云凡病多服丹經三五已上者不可食陳臭

爛敗之物生ヤモウ完アモウ蒜アモウ蘆之類

又云勿犯肥鮮生血五辛生菜等食其餘一無所禁

大清經云凡當服丹時慎黃牛ニシム、羊、血、羹、白、酒、倉米、
麋、鯉、魚、及、麋、夏、爛、敗、之、物、並、不、得、犯、之、自、餘、任、情、丁刀

又云服丹之時不宜契、熱、食、熱、羹、食、為、須、冷、不、宜、過、熱、七ヤカ
即、ヤウ發、動、其、藥、令、人、セ吐、逆、諸、服、丹、雄、黃、八、石、皆、宜、斷、而、食、ハシ
不、然、者、既、不、治、為、久、シカウ、使、人、半、身、不、隨、慎、之、ハシメ

服丹禁忌第十三

呂魂丹方云凡有、ラ一切、喪、孝、亡、死、之、家、產、婦、淹、穢、之、處、從、於驗又
始、テ至、未、並、須、慎、忌、

服丹發熱救解法第十三

大清經之凡服藥藥發動之時即覺通身微腫或眼中

浸下或鼻內水流或多呻吟或坐噴此等並是藥覺

觸之候宜勿恠也可停服三五日將息時以生熟湯浴

之為佳散冷麥粥兩頓点好得平復已後依前更

服每一日服藥宜二日或三五日停服並應自斟酌其方

凡服丹不意過度熱悶垂犯者宜急散髮促頭以冷

水三三升細淋頂上須臾便定若更不定者依前更淋之

遠不過用三五升即定唯不得飲冷水若大困者之可飲

本漿又可飲藍汁鷄子汁亦可合食三二口酢飯葵菹若

金石凌澱雪膏及朴消粉等宜蜜水各一鷄子ハカリ許ハカリ先和之令相得曰以朴消粉大稱ハカリ半兩又合攪カク相得服之立解ハカリ又可食苓葵豕猪肉酢イヒ飴黃連汁葛汁太小豆汁米泔米粉水

服金液丹方第十四

服石論云金液華神丹無慎忌療万病金液華神丹本是太上真人九元子之秘方此藥ル所合ル非俗人所知ル但以ル陰相催ル四時輪轉ル有生之類ル儻忽如流ル先賢ル愍而零涕ル注指觀ル而興威感遂乃流傳ル信代以救蒼生ル之病使百姓有病

之後或能除愈至如腐腸之疾遇藥便除膏肓之病無

不瘳愈纖毫必遂肌理無遺此藥力有越電之功左右

韻詮音介至也

大陰真別類秋霜一屈松竹与蘭艾何同害於人者不日

大清經云
鉤吻者
大陰
精也
入口使
人即死

而除損肌膚者應時而遣若服此藥有異於常不問陳

倉生冷至於平食莫蒜酢滑猪廉同時共食唯多益善

元

おク

並禁忌藥之對病如後所陳

夫人受五常非是一體或患久冷滯疴頭面枯皴身體

祝滿

居耐又疾也カシカキ

雄乾准皮与骨食不消化米粒渾出復患心脾淡飲食乃無味

タトヒ

切ハ又ストモ

リ

古額又三月也

コトナ

假使食訖復患惡氣上填胃唯多飲吐冷沫夜卧咽喉

三

三

乾^キ燥^ホ舌^シ上^カ皮^ク頰^ニ夢^ア見^ハ雷^イ電^ハ之^ニ聲^ニ或^ハ夢^ア踰^エ山^ニ越^ハ海^ニ睡^ニ中^ニ厭^ト

手^テ足^{ソク}酸^ス疼^シ背^セ膊^ハ煩^ニ悶^ニ蜚^ハ尸^ニ雜^ニ症^ニ中^ニ惡^ニ卒^ニ死^ニ腰^ニ疼^ニ膝^ニ冷^ニ

天^{テン}陰^{イン}即^ニ發^ス或^ハ患^ハ五^ニ勞^ニ七^ニ傷^ニ中^ニ寒^ニ痺^ニ濕^ニ復^ニ有^ニ男^ニ子^ニ婦^ニ女^ニ僧^ニ

尼^ニ窠^ニ婦^ニ少^ニ女^ニ之^ニ徒^ニ夢^ニ与^ニ鬼^ニ神^ニ交^ニ接^ニ真^ニ似^ニ生^ニ人^ニ初^ニ得^ニ著^ニ而^ニ不^ニ

言^イ後^ハ乃^ハ隱^カ而^{シテ}不^レ說^ハ注^ニ還^ニ日^ニ久^ニ鬼^ニ氣^ニ纏^ニ身^ニ腹^ニ內^ニ病^ニ成^ニ由^ニ惜^ニ鬼^ニ情^ニ

至^シ死^ニ不^レ道^ニ鬼^ニ魅^ニ耶^ニ氣^ニ所^ニ纏^ニ眠^ニ多^ニ坐^ニ少^ニ夢^ニ想^ニ飛^ニ揚^ニ魂^ニ魄^ニ離^ニ

散^ス昏^ニ常^ニ困^ニ似^ニ暑^ニ還^ニ寧^ニ諸^ニ有^ニ讀^ニ誦^ニ之^ニ人^ニ常^ニ吸^ニ冷^ニ氣^ニ衝^ニ心^ニ

腹^ニ腸^ニ雷^ニ鳴^ニ鎮^ニ如^ニ雷^ニ吼^ニ復^ニ有^ニ百^ニ廿^ニ種^ニ風^ニ十^ニ種^ニ水^ニ數^ニ赤^ニ白^ニ等^ニ

利^ニ多^ニ年^ニ不^レ差^ニ之^ニ徒^ニ此^ニ丹^ニ並^ニ皆^ニ治^ニ療^ニ此^ニ藥^ニ所^ニ合^ニ非^ニ是^ニ道^ニ人^ニ不^レ知^ニ

其妙自量其性側其勞逸臨時斟酌方委其功諸方君子

無乃輕洩祕之

今案服法對治并可依諸丹之法但件藥主治余云或有

服三丸或有服五丸病差即止此非養生之丹不可多

服云々

服全陽丹方第十五

全陽丹主治頭風咳嗽逆喘息逆吐腰脚疼痛氣力怯

弱一切風病胃中痞癖宿食不消見飯易飽離院

還飢瘦弱虛損耳聾身熱悸陽遺久衰陰委不起益

精駐顏滿髓輕身能食有力令人肥健

服法先喫鴛藥

用溫白丸

下去腹中宿穢明日早朝空腹

以酒若漿下一丸從此每日服至廿九以下廿九以上即止若

無効驗重加服廿九以下但病重者服五十九以上六十丸

以下若猶無力服至百九以下一切可隨疾患輕重豈可守

株哉患者若欲得早除每日服二三丸必得然欲服時取

二合以下飯淨淘吞藥後即喫三四口許飯之忌藥氣衝

上頭面但病在胃臍以上者先喫淘飯後服丹藥病在

腰以下者先喫藥後食飯若在頭面及遍身者不用

淘此字欵
許拱文

漏也

淘飯只用酒漿若患煩悶時服金汞丹甘豆湯蘆根湯藥如有發動可モシ依治石發方

禁忌猪肉油膩陳臭黏滑海藻五辛五食青

菜等

服石鍾乳方第十六

性味功能

本草經云石鍾乳イソナ味甘溫無毒主イソナ妙送上氣明目益精

安五藏通百節利九竅下乳汁益氣稠補虛損療脚弱

疼下焦傷竭強陰久服延化年益壽好色不老令人有子

師說驚管
者如驚
羽在禁也

不練食之令人淋

陶注云唯通中輕薄如鵝管碎之如甲中無應
齒光明者為善教注云雅厚而光明可愛餌之

者婆方云夫鍾乳者取管成白光潤澤如蜚蜋翼者
好得服之即得力厚者不可服之耳但水而南流者上
東流者次餘方不中服之凡鍾乳白光者為上黃光者
為次赤者不中服性大熱諸長生補益之中不過乳
也須常服之服乳人若多真只得九年即死好慎
之唯不能禁真勿服之

樣要方云鍾乳所以仙人名之曰乳此精膏所作与切凡
石懸珠絕倫不比類也師云服一斤乳盡百病除一斤乳

身之氣也

也

盡潤及三代三斤乳盡者臨死顏色不變縱在地下滿五
百年後還穿塚出即成僵人也此人在俗及至千年
皆不得迴顧者即是也干以外者行日中久無歇遂
成真仙官也

夫鍾乳此石之精膏也不与石雜獨生石室宜神丹
為地所以然者凡作丹法皆飛諸石精以為霜雪而遂
成金銀服之立仙矣是以服丹之士先服石之精髓与
丹為地若乳与丹相兼而服之者能理丹石補虛益
精久服之即能變練骨髓老而更少令有子養性

要藥也

服乳法

凡服乳撰王相曰及建除開日吉又常以代已日用之
凡欲服藥須先服寫藥除去腹中惡穢
凡服石者若有癖者宜下之若人疲弱者未必下也
凡服藥先首於吉日清且具服嚴飭淨瀨其口面東立
再拜一心發願服神藥已後千殃散滅百病消除志
求長生無違其願一切大聖加護去者還年發此願已又
以淨水漱口先念一凍核許蜜次以一二九服之

凡服藥者王日服レ寫藥而相日服藥從一丸起稍積日服之可至二三丸重以二兩為一劑

凡服乳之法始以溫酒服之二三丸次日五丸次日七丸次日九丸次日十一丸次日十三丸然後以十五丸為法不過於焉コレ

凡服鍾乳丸五六十九丸未得力者可服一二百丸稍停トル候氣色ツカサ

極要方寧腹服鍾乳法右取成練乳七丸秤分一兩分為再服且服暮令盡シム無問乳之多少此一兩為一度

凡服乳皆須溫清酒服之恒令酒氣不絕為佳不得醉

服乳之時唯須少食一日喫一升許飽得滿三日吐出即其乳

吐不隨裏下乳在腹內三日練之便化為津液入人骨髓若

食多者其乳未化不至晬時乃隨大便而出後損功夫

仁音祖傳及從今日立至明日方夕有言半日從日至暮也謂之半日

不得其効唯須少食滿三日外待舊裏出訖任意作

美食補之三日補之更欲服者還依上法將息如前其乳

多少者任人貧富云々

鑒真服鍾乳隨年齒方石鍾乳其味甘溫無毒年

少者服二兩乃至五十服五兩六十已上加至七兩各隨年服

之吉世已下人兩分為兩服五十已上二服一兩別和麵三兩

カキホトホカ

攪漉麵硬漉カキホトホカ作饅飴カキホトホカ以五升鑊中煮ニル五六沸即熟ニル和酒令

汁盡コイ服之竟五更又介以煖飯押シムル之七日已來忘如藥法

李補闕練研鍾乳法取棗膏和乳クダキ研クダキ令相得シム每旦空

服腹十五丸如梧子テ以煖酒下待飢方食ハル宜用少ハル不令飽ハル

每日數テ任性飲酒令體中薰ニル恒有酒氣ニル使宣ニル

當服乳時三日五日クダキ喫クダキ一兩口倉米飯及少許ハル是敗脯肉ハル

及見喪孝屍穢シキ並不須避ニル令其慣習ニル每年恒服一大斤ハル

已來四時並得服ハル復秋新理ハル立冬服之ハル

石論云若服藥先後飲食相近者ハル難得藥力ハル皆須晚食ハル

少食不通過多則令藥勢不行所以須少則易通
則速得藥力宜慎之空腹及下後不可服更三日調養
然後始服石若下後只服藥或藥帶着曲與之要經歲
不解之服藥之後仍行百步即乳氣入腹得力尤速
若覺熱進一兩口冷餅行步消息良之

補乳法

石論云凡服乳石十日還十日補百日十日然以此為率半
卧起寢處免須香潔衣服新鮮薰裏如法常侵早起
服藥引則神清而藥行每五更初即起扣天鼓卅

胃下不食下

廿一

示通又酒是性命之本朝暮常須飲熱羹セリ恒令體中董セ仍不得飲白酒又澡浴勿シ向湯水中坐アル宜以湯水淋之

極要方云凡三日服乳還三日補之十日服十日補之ル為

寧補乳法欲得飽食服乳法欲得少食補乳欲得食ル

牛羊獐鹿等肉諸良多与麋同麻属也煎取汁任意作羹食散之不得食

倉米粳肉等物以外ハ忌

凡初服乳至補フル忌不得行房出精此最大忌慎之又

服乳補日訖ナ可更一月許將養方可洩ハル不可頓ニハク寫則令藥

氣頓竭慎之

服乳得力惟

搔要方云凡服乳得力之時先覺唇下繞脰肉起身體發熱食味甘美其陽氣日盛數起之慎不得近房若後大起唯行房慎不得出精此為養其精氣令腹中肪成乳氣盈溢遍流百脉則令人陽盛而且熱百戰不怠永元五勞七傷

服乳禁忌

冊繁論云凡禁之法若藥有乳石須一月日外若不

如介ニカレ非レ准ルヲ不得力カヘ翻致禍也

耆婆方云凡服乳藥通忌生冷酢滑ニヤカニク麤オカシルヲ腥臭モク大飽大飢キモク

及真憂悲泣愁不樂不得冒諸風雪及淹穢之事常令

酒食氣溫ニ然恒取暖常自逍遙適意服乳忌五茹地ムサヒ

榆為藥去之ムサヒ

槿要方云不得眠真怒及大喜忌房室勿飲白溜冷醋

等物及多食餅熱食及猪魚ニ穢腐臭之物ニ不得食大

馬百種ニ雜肉ニ及芸薹胡荽臘粉麵餠舖之食不入產生

喪孝之家不語人我服此藥

糯力達多
麴也

石論云凡服乳石莫生真怒調和情性歡娛暢悅節房ト云

室省睡眠不用大真太喜憂思哭泣不宜食煎糯ヒニカク冷硬

難消之物可食細軟甘美之味以調之

盧達及脫粟米也

凡服此藥禁忌陳夏生葫蒜雜生菜猪犬肥養諸

滑物生魚鱉鱸生冷油麵等クヒヤカニテフアルモ

服乳發動對治法

釋慧義云鍾乳致令人頭痛飲熱酒即解トク

極要方云凡服乳以後身中先有諸病コトハ多者キフ乳力共病

相攻病氣猶強乳力未成必相對作ニ

醫心方卷下

卷二

凡水動鍾乳雨自疼痛海蛤動乳令人頭痛腦悶

倉米曼完動乳令人骨節發瘡及發背

房動乳令人少氣力更煩痺不令令人面自身體痿

不危及不能行痺濕病也

黃食飲不調動乳乍寒乍熱腹中碎痛或痢或吐

見食聞曼

四時節氣冷熱不調動乳狀似瘡發不早治之變為

丸

黃疽

今皆療之方看上件發動形狀必須細意察其所患

根本須各相當知其審候療無不驗勿令失之毫毛

差^{タカ}之千里

若諸菓動乳取甘草一兩灸麻黃一兩去節切以水二升

煮取半升和清酒半升先火邊灸令遺熱後徹飲汗ホ

目即熱アタヘ脹之令盡シムセ被覆卧取汗即老シメテ

倉米臠肉動乳ハル必須エ以豉クキ作湯ナ細ハツシツ服之可シ互ナ六度許

倉氣自消エ所患目老フル

房室損乳者必須ハル閉氣調之一日一夜又須ハル牛羊腎

煎ハク作羹食之男患フル之令婦人棲ホ身太婢及女若又正也持也體女患令男モアニキウ

夫棲ホ櫛必不得更犯如此調之三日三夜自然覺健ホ若ホ

棲ホ後最和
ニ及説文
云權也二日
兩手相切
摩也

其心分氣下乙

六日

食飲損乳者以葱豉湯裏肉當歸一兩煮之去滓
溫服之便差仍未除者可作蘆根湯服之

蘆根一握地榆一握 五茄一握切以水三升煮取一
升一服

若四時節氣冷熱不調動乳者必須作生熟湯以
器盛之入湯中坐勿動須臾百節所有寒熱之氣
皆從毛孔而出變作汗若心中熱悶者還服少許熱
湯即定

耆婆服乳方云若發熱渴者以生蘆根一握粟米一合

煮米^{タイ}熟^{ヌル}飲之甚良

又服乳^ラ訖^{ハリ}單服^{ヒトハ}菟^ネ糸^セ子^{クセ}三斤大益人又方車前子^セ佳

服紅雪方第十七

服石論云八仙公絳雪療諸百病八公所授^ル淮南

王絳雪方者即此是也公日子得此方當不^ル妄不^ル

暴^セ神妙無比^{ナラヒ}大和先生名^{ナハ}之^ケ曰^ナ通中散^ト深重此

方每合之進上又常勸人服之世人或有^ニ竊得^ヒ

此方合之者^ル俗共名之曰紅雪皆盡不得其要決

又不經師口決或藥種短闕分兩忝差或合
和失宜煎練過度故用之療疾多不有効今
具載藥數分兩并四時合和方決口決要錄
所主病狀服法禁忌具件如後合之者不可
率意加減以誤後人煎練過度虧於藥
力此皆按經方派師口決既免暴殲之
憂實亦存生之至要宜寶秘慎勿輕
泄非道之者無妄傳也所主療病狀如後
療一切丹石發熱天行時行溫瘧疫癘疽發

病源論云
咳味音果
名作咳
寒則
成之

背上氣咳シハス凍脚氣風毒肺氣肺癰涕唾涎
黏頭風旋憤面目浮腫心胃伏熱熱骨勞熱他丹多開也
口乾口臭熱風衝上目赤熱痛四支攤緩緩
心忪驚狂恍惚謬語骨節煩疼皮膚熱
瘡昏沉多睡赤白熱痢大小便不通解藥
毒食毒酒毒

右患已前病者並和水服之

諸氣結聚心腹脹滿宿食不消淡水積聚醋
咽臨吐產後血運中風悶絕產後熱病墜

墮畜血

右患已前病者並和酒服之

又云右与病相當者取一匙絳雪以新汲水二大合及蜜水亦得内於水中令消頓服之

今案外臺方云凡服石之後若覺大熱者

可服紫雪或金石淩或絳雪或白雪等但半

大升水取瓷研一大兩香湯浴後頓服之

又今時之人隨身強弱或三四兩或五六兩就研

空腹服之又存方載作日之忌無能時之

禁而藥中有朱沙甘草槐花可忌血食海
藻猪完又私記云婦人有孕不得服之

服紫雪方第十八

服石論云紫雪療脚氣毒遍身煩熱口噤口中生

瘡狂易叫走并解諸石草散藥熱毒發卒熱黃

疸瘴疫毒癘卒死溫瘧五尸五注心腹諸疾絞痛

盡毒鬼魅野道屍骨並熱毒諸熱風時行疫氣

小兒熱驚

癰利血諸熱毒腫瘰癧子一切熱主之尤良

病者強人一服二分三分和水服之セヨ小老弱人或熱毒
竅者服之以意減少脚氣病經服石藥發熱毒悶者
服之如神水ミ和四分服之ミ上極要方

若脚氣衝心取一小兩和水飲之若心戰衝取半小兩
令消已水下ミ急得若有風癇時服之如前理丹石若
丹發頭痛身體急或寒熱不能飲食即取一兩加
少硃消和水飲之若熱痢急如前若天行熱病急如
前若欲痢者加之一倍空腹張之若邪氣者漸服即
並可也鑒真方

今案今世以此藥不當紅雪一兩又依如外甚
方可服大一兩

服五石淩方第十九

服石論云五石淩食後以蜜水一杯服方寸匕大熱者
加至二匕患熱病黃者服三匕即愈初得熱病脹二
匕^左愈無禁忌

秘記云治一切熱病及服金石散動悶亂熱困者以
水一杯服方寸匕大熱者^世加至二匕

^{治本要之醫者不可有}
今案今人或三兩或四兩水服之吉

服金石凌方第廿

服石論云金石凌若有溫疫熱黃病取少秤一兩水
和服之即得差若金玉諸石等發熱以水和秤一兩
上疑者服之若病上發少食服若病下發空腹痛服之
不可多服大忌冷無禁忌

今案大清經云一鷄子許宜蜜水和服又外臺方

大一兩水服

服金汞丹方第廿一

金汞丹方主解五石熱毒發動大夫女人久患勞損

身躰瘦薄益氣力明眼精長髮悅澤顏色兼除百
草毒除冷疾外元不治之

服法每日二三丸或五六丸以冷水下之若熱氣盛
發服十九丸不間空腹食後

凡欲服藥時當先沐浴齋戒炷香向生氣方閉眼摺
念至心敬禮天地祥感萬物應化皆自勤致其靈應
以此言之服石吞藥之畢敬信為先不可輕慢

服銀丸方第廿二

銀丸主一切虛熱明目押虛風驚悸癰心熱一切熱

病皆患除之其功效不可言盡之但病差心之不限
丸數多少元禁如銀モシ不滿五兩トモ隨多少得之食後
服五丸シモ忌不セ服セ寫藥

醫心方卷第十九

醫心方卷第十九背記

三治本目錄次第

服石莖度第一

服石莖動救解法第二

服石莖特救法第三

服石莖常性法第四

服石莖得方候第五

服石莖忌法第六

十九

以上相違校重基重志奉之虞如法奉次第内字
治奉次第辨注付也
未考可裡打

以上第一葉

醫心方卷第十九札記

一頁下 洋冰積外臺洋作泮與舊校合 實謂之矣外臺

之行 美案古實是通 二頁上 滿二百罐玉篇罐說罐

用謂之二字疑誤倒 五行 故實制作故固同 下四 廩丘

及案玉篇雖蘇田 行 故實制作實是同 行 廩丘

切器名與此別 行 故實制作實是同 行 廩丘

下又作稟丘病源引廩兵 溫膈膈即暖與暖同舊校

公又云復有稟丘家並同 溫膈引玉篇膈字注蓋後

人所 三頁下 以去千金去 可服三年一割千金作

服一割正與下 九精藥延慶本藥作 四頁上 經

一例此蓋誤倒 行 九精藥華千金同 二行 經

便輕訛經千 五諸難難訛難千 但知千金知作

七速發有而病源此下當 金石病源作土石 行草木

盛也延慶本盛字傍記感下文未盛同案久義盛九

其有病病源無行一或得病源得五頁上发性即

天性生命也二行稟丘病源作五頃躓躓即躓八

遂凌陵訛行一秋美延慶本美字六頁上之耳自

首至此仁七頁上噤不如解仁和尚寺本不作小解忍

錯誤或曰不小二字五行當風也仁和寺本此下有飲

不耳待以八行所服仁和寺本所下六投雷未詳

怨當訛謂前文所云當飲酒當將冷當多食飲當勞役

八頁上之治仁和寺本下一行面為面訛五藥

之仁和寺本無九澆灌仁和寺本六行九頁上此名名

疑石行六困不仁和寺本十頁上七行遂絕仁和寺本

下六凡治仁和寺本六以治者病源無七行恩也病源

無也十一頁上八行注寒重衣外臺引張文仲九行平

人飽則食不消化外臺作平人飲節即外臺無節

下一宣散外臺作七底薄外臺底作榻九常疾仁和

寺本疾作十二頁風溫濕訛溫仁和寺本風涼注

宜常當風外臺無常三不能病源同外下五才不

仁和寺本無六身癢仁和寺本癢下九隆侍郎下

引釋慧義薩侍郎上文所云薩曜是也下文屢云薩公
外臺名作薩侍郎蓋薩即薩俗字猶卷中肇又作薩之

例十二頁上四行坐服仁和寺本坐九科頭科即科科頭
也上四行坐服仁和寺本坐九科頭科即科科頭

傳觀志管輅傳謂不著巾幘也舊枝下三懃於懃病源

勤仁和寺本無六自明病源同仁和八隔并隔并病源

傳與舊枝九汁出病源同仁和十四頁并奔并奔病源

進六藥積仁和寺本藥上有食字病源下五卧温

病源同仁和七籍卧籍卧病源籍下有八迫之迫之病源

作十五頁尉病源此下有三促冷促冷病源促字但冷

源多五黑契作有病源契下下一衣温得病源作二

促起行飲契酒

行病源促作但無起

櫛梳四

三字病源無

仇脚指間

作病源指

上十六頁

不可得屈

有病源屈下

行三

促下

作病源促

契酒

病源無契字與舊校引小品合

行八

強駢

仁和本

強作

弦病源同据下文契多則弦駢之文弦字似是

上十七頁

藥勢

勢契之訛和寺本正作

契傍校

作勢非

三實氣

病源實作真

行四

唯有藥雨

猶有病源作准有藥氣尚

自獨行

据此

行二

其令酒

雨得行

病源酒下有氣字下文云酒雨行於

四交

行下八

哈之

仁和尚寺本哈作含

上十八頁

不吐下

不絕者仁

寺本

者下有

契入

仁和尚寺本契字重

行三

陰囊

仁和尚寺本陰作

陰病

源同

消蘓

外臺蘓作蘇紫蘓蘇之古字病源作蘇誤

不下

仁和尚寺本不上有若

聖心方卷下乙巳

三

行七
杞

和奇本沉字

疾源字作

契伊源即作使使病

行血癰氏
俗癰即字癰也

添
行
鍍
鉄
和仁

又有
行三
斑璘
余

所仁
作和
折寺
目年

行下
三

疾痛

仁和寺本
作痛疾

行所衡

仁和寺本
衡作

行昏恍

寺本

悅作悅

上廿四頁

又諸

仁和寺本
別提

行藥疾

仁和寺本
疾作

疾延慶

下四

契孽

仁和寺本
無契字

上廿五頁
諸痛

以下一
條仁和

寺本

上廿六頁

藥疾

仁和寺本
疾作

行新溫

仁和寺本
新作

漸延慶

下三

外灌

仁和寺本
上有水字

行此亦

仁和寺本
無亦字

行道弘

仁和寺本
別提

上廿七頁

飢發

仁和寺本
作飲發

上廿八頁

上贈

外臺卷三十七引
薛侍郎云取鮮鯽魚剥去鱗破
腸血勿洗之但用新布一二尺淨拭令血脉斷名

日上

行八澆浴

延慶本
澆作浴

行便水

延慶本
水作水

行注有第

十有

行九此

四時

仁和寺本
延慶本同

上廿九頁

行瘧苦寒

醫心方卷之十一

日

紫癰蓋惡寒貌恐是色穿從疔者色番同真本黃帝

內經明堂卷一中府主胃痛惡清胃中滿色然揚上

善注色惡寒狀有本作色下三行三喰延慶本行四

巾冒冒訛冒仁和廿頁上石士仁和寺本士作土延

下四故恙仁和寺本行九脂藥仁和寺本上廿一行

切力功訛切仁和行下一悠悠怒之发狂狂訛

巧曆巧曆謂巧行七赤有亦訛赤仁和寺本如愈如

同八過此仁和寺本過作上廿二頁淨頼頼訛頼下

上廿三頁品有仁和寺本行下三恙白訛曰仁和

行四少犢仁和寺本上廿四頁倉米麦延慶本麦作後案

未者与稜角

下一

服藥藥

舊按下藥穿點去

頁廿五

行膏旨

仁和尚寺本

行酢滑

仁和尚寺本

上八頁

鎮如

雷吼

雷鎮填同雷聲楚碑

九歌云

行下六

全陽丹

寺仁和

全作金

八

離院

院即院

上八頁

去者

仁和寺本

世頁上

醉吐

仁和寺本

滿三日

仁和寺本

真下

仁和

寺本真

世二頁

喜忍

忍訛忍仁和

上九頁

相政

訛政

政仁和寺

對作

對即對俗仁

上六頁

目美

自訛目

本作

世六頁

今案外臺方

今案以下例低二格此誤

世七卷

引崔

四十七頁

野道屍

案道下忍

下七

石

待郎文大異上七行

七

卷一百一十五

五

一八二八

消

耗即芒俗

下八行

金永

永俗永字

醫心方卷第廿

後五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治脹石除契解發方第一

治脹石煩悶方第二

治脹石頭痛方第三

治脹石耳鳴方第四

治脹石目痛方第五

治脹石目無所見方第六

治脹石鼻塞方第七

治脹石口干燔方第八

治脹石口爛右痛方第九

治脹石口中菱瘡方第十

治脹石心噤方第十一

治脹石齒痛方第十二

治脹石咽痛方第十三

治脹石心腹脹滿方第十四

治服石心腹痛方第十五

治服石腰脚痛方第十六

治服石百節痛方第十七

治服石手足逆冷方第十八

治服石身弊生瘡方第十九

治服石面上瘡方第二十

治服石結腫欲癰方第二十一

治服石癰疽發背方第二十二

治服石身體腫方第二十三

治服石身體強直方第二十四

治服石藪黃方第二十五

治服石嘔逆方第二十六

治服石噎噎方第二十七

治服石上氣方第二十八

治服石淡癰方第二十九

治服石不能食方第三十

治服石酒熱方第三十一

治服石淋小便難方第三十二

治服石小便不通方第卅三

治服石小便稠數方第卅四

治服石小便多方第卅五

治服石大小便難方第卅六

治服石大便難方第卅七

治服石大便血方第卅八

治服石下利方第卅九

治服石契渴方第卅

治服石冷契不適方第卅一

治服石補益方第卅二

治服石經年更發方第卅三

治服石除契解發方第一

龐氏論云凡藥欲發之候先欲頻申或苦頭

頭痛目疼身躰癩瘕或驚恐悸動周身而

癩瘕瘕病
乙又癩病
九又癩病也

醫心方卷十

二

強或耳中氣滿如絆車之聲或躰契劇於

漆子老久治也

火燒或如針刺噤燥惡寒昧昧、憤、不知

病處或腹中燠熱如燒鋸鉄懷之也其菽

甚者腹滿堅於材石繞口青黑大小便血而

多無脉也如此之病歸於大澆以老為期也

病洎論云夫服散之人覺熱即洗覺飢則食

先食不時失其節度令石熱壅結否塞不解而

生熱也故須以藥除之外臺方云凡服石之後若

覺大熱者可服紫雪或金石凌或絳雪或白

雪等但半大升水取セラ瓷研一大兩香湯浴シラレクタイ後頃ニ分
服之候セヨ一兩行利熱乃退矣セリソイヨ凡此救急中紫雪為
上

千金方玄解一切藥發不問草石始覺惡方イトル

生麥ヤトル門冬八兩 葱白八兩キフネ豉三升イヤル

三味水升セ煮取二升七合——分三服

又玄治服散忽發動ル葱豉湯方

香豉二升クキ 葱白切一升キフネ乾藍三兩ホシアヒ 甘草二兩アトキ

四味切以水七升煮取三升半分三服

小品方玄餅トシ寒食散ハル或頭痛或心痛或腹痛
或胃脇腫滿或寒或熱或手足冷或口噤或口瘡
爛或目赤或于飲惡食氣便飲吐或狂言倒錯不
與人相當或氣上欲絕進退經時散殺百端服前胡
湯得下便愈方

前胡ウタケ二兩夕藥エヒシクモ三兩黃芩ヒシキ二兩大棗オホナツメ廿枚甘草アトキ二兩大黃オホシ

二兩凡六物以水八升煮取二升半分三服脇堅滿加伏苓

二兩胃中滿急塞加枳子カフタチナフ一兩連シキリ胃中冷不用食加生

薑三兩虛乏口瘡加麥門冬二兩若加藥者加水作

九升也 錄驗方夕藥二兩

治下元
又玄解散三黃湯治殷盛熱實不除心腹滿小便赤
大行不利圯逆充胃中口焦燥目赤薰方熱

黃連二兩 黃芩二兩 大黃一兩 甘草二兩 芒消二兩

凡五物以水五升煮取二升半內芒消令洋分三服

同前

又玄小三黃湯是由來舊方與前治同然石勢勝
前方除實不如也

大黃一兩 艾子十四枚 黃芩二兩 豉三升

凡四物以水六升先煮三物令數沸以豉豉內湯中

取二分分再服

又玄增損皇甫文子豉湯治人虛石盛特折石勢除熱
方

豉一升半 文子十四枚 黃芩二兩半

凡三物以水六升煮取三升去滓泥生不內豉令得二分
三服

又玄解散熱發身如火燒黃芩湯方

黃芩三兩 甘草一兩 枳實二兩 厚朴一兩 桔樓一兩

夕藥一兩 文子十四枚 凡七物以水七升煮取二分半分

三服

又玄解散除熱心煩^ル斂毒^ル單行薺^キ芩湯方薺^キ芩半斤

凡一物以水一斗煮取三升分三服停冷飲之^{言在音移 アラハシヒヌテ}

又玄解散除熱單行^シ凝水石湯方

凝水石四兩凡一物以水四升煮取二升半服七合日三

糧慧義玄解散^{ヤア}麥門冬湯方

麥門冬一升^{ヤア}豉二升^{ヤア}支子十四枚^{ヤア}葱白半斤^{ヤア}

凡四物以水六升煮取二升分再服

新録方玄解散方

艾子人クナシラネ一升 葱白シホ一升 猪脂イワブ四升

煎葱白シホ焦布シホリ絞去滓カサ一服如桃李日二三石當如

沙尿ハリ中出い

又方水服ハコ大麦ハルシホ祝米ハルシホ麴ユ五合日二三

又方飲熱酒シム使シム薑シム下シム然醉

又方飲牛乳五六升勿絕佳

又方數飲シム五漿シム日一二

急藥方玄丹石立驗方シム

甘草アトキ二兩ハコ 于葛ハコ二兩 豉アトキ一大合

右以水五升煎取四升食前温喫カレ食後冷喫ヲ若

不以更喫ヘ

石論云除契調石蘆根湯方トウリ

生地黃四兩切麥門冬二兩去心甘草一兩炙蘆根四兩切

伏苓三兩切凡五物細切クハシク以水七升煮取三升能テ去

滓カシ冷分三服ヒニ

又云甘草湯方

甘草二兩炙大豆五合棧

凡二物以水五升煮甘草令シメ棧サ一升内大豆煮取

甘草湯方

二升半分三服

治服石煩悶方第二

病源論云將通失宜冷熱相搏石勢不宣犯熱氣

將也良及遂
也付也
大也助也
字也

乘於藏故令煩悶也

僧深方解散甘草湯治散發煩悶不解方

甘草一兩半 伏苓一兩 生薑一兩

凡三物以水三升煮取一升半分三服

今案小品方甘草二兩黃苓二兩大

黃二兩水五升煮

取二升分三服

張仲景云解散發煩悶欲吐不得單服甘草湯方

極動也助
才也續丸
助也五上聲

甘草五兩切以水五升煮取二升服一升得吐便心

新錄方玄煩熱悶者方

薺切三升水四升煮取二升分飲之

又方單飲生地黃汁日二三升佳

又方飲二三升生葛根汁良

提要方治乳石發動煩悶頭痛或寒熱脚冷氣

不通方

葱白十四莖 豉二大合 牛蘘一大兩

右於鑊中鋪葱即安蘘於葱上即著豉以

果心方卷十

物魚鋪上緩火煎候ル蘼氣銷盡即淋シタ好酒

一升半良久即得取屑エ冷熱頓服隨性シタ多

少飲之ル

又玄石菱煩悶者方ル

滑石十二分研令麴分兩服

右以水六大升合和滑石末一帖和攪令散セ頓服ル

治服石頭痛方第三ル

皇甫謐玄或頭痛欲裂坐服藥食溫作丸癖急ル下

之曹欽玄頭面若眩冒者則解頭結散髮扇之善療天澤熱甚頭ル

治年元^ニ發^ル年^ノ下^ニ有^ル痛面赤者以寒水淋頭不^レ是^レ以油囊盛水著頭結中

外臺方云或頭痛如刺眼睛欲脫者宜以香湯浴頭^ル畢

靜大屋內適寒溫先以湯淋大椎及頸上三五^ニ十^ニ梳然後

乃浴勿令見風浴訖覆被安卧取汗仍須喫^ル葱根葛豉

粥法

葛根去^レ握^ル 麥^ノ下^ニ無^レ意^ニ根^ノ百^ニ葉^ノ藥^ノ共^ニ可^レ有^ル伏^ル外^ニ證^ノ年^ノ下^ニ動^ル

葛根三大握 干薑六兩 頭豉三合葱白一大握生薑少

許枹十五顆 先以水五大升煮葱根減半去滓下葛

及豉煮取二升去滓細研少許米作稀粥并

著葱白等煮^ル熟^ル進^ル喫^ル散^ル脹^ル之^ニ託^ル依^ル前^ニ覆^ル被^ル

稀^ニ切^ル作^ル稀^ニ粥^ニ也^ニ
依^ル稀^ニ粉^ノ餅^ノ也^ニ
言^ル布^ノ

取汗訖令婦人以粉遍身揩（レ）摩（レ）攸（レ）孔合半日許

苦獸文也

始可出外其病久差

治服石耳鳴方第四

皇甫謐云或耳鳴如風聲汁出坐自勞出力過差

房室不節氣并奔耳故也（ル）懃好飲食稍行

步數食節情即心曹（ル）歛云耳鳴汁出數々冷食步行

宇治本无く曹字有く

治服石目痛方第五

皇甫謐云或目痛如刺坐（ル）契氣冒肝上奔兩眼

故也勤冷食清且以溫小便洗之又云或頭痛項強

宇治本无く曹字有く

兩目疼者以水洗浴ヨ即老

穉慧義玄解シ散治目疼頭痛方イタキ

芍藥三兩シムナシカウ

葛根二兩クシラネ

細辛二兩アラウキクセ

五味子三兩ハルカナ

木四兩シケラ

伏苓四兩アサホト

黃芩二兩ヒメシキ

人參二兩ヒメカハナ

凡九物以水一斗三升煮取三升分三服

僧深方治散家目赤痛ル菱人洗湯方アハアイシム

菱人廿枚

細辛半兩ヒメシキ

苦竹葉一枚カクワ

黃連一兩カクワ

凡四物水三升煮取一升半一方取半升可日三洗

可六七洗

果心方氏十

乙

蓮花 鹿
大 小
如 桃

治服石目無所見方第六

皇甫謐云或目冥無所見坐坐飲食居居憂溫故也

脫衣自勞洗但令飲食須臾自明

釋慧義云散散契契氣衝目漠々無所見方

黃連クシツクシ 于薑オホハシカミ 細辛ヒギラヒタヒクモ 麤核

凡四物分等吹咀綿裹淳酒五升以藥內中於

銅器中煮取二升半綿注洗目使入中日再

治服石鼻塞方第七

病源論云菰則將令其契盡之後冷氣不退者

噎シメ 噎シメ 噎シメ

冷乘於肺（九）主氣開竅於鼻（若子元穴也）其冷滯結氣不宣通（世）

故鼻塞（フヒカレリ）

曹欽玄（字治平元）重寒卒有冷逆平元（字治平元）冷飲冷洗

秦丞祖云治解散勢勢盡肺冷鼻塞宜服茱萸

湯方

蜀椒（大九ハレカミ）一分 甘草（アアキ）一兩 干薑（オホハレカア）一兩 朮（サケラフ）一兩 桂心（サケラフ）一兩

茱萸（カウハレカア）一兩

凡六物細切以湯六升煮取二升半分爲再服（九）

治脰石齒痛方第八（十二）

以下治牙痛方次第與前相連仍互之

治牙痛方第八

ト

皇甫謐云或斷腫唇爛齒牙搖痛頰車噤坐犯契苦協久面也

不時救故也當風張口使冷氣入咽漱寒水昂老未居丸

治脹石咽痛方第九

皇甫謐云或咽中痛鼻塞清涕出唾溫衣近火故也

促脫衣冷水洗當風以冷石熨咽頰五六過自老

治脹石口于燦方第十

小品方治口中于燦渴噓不下食方

蘆根多少煮取濃汁以粟作粥漿服多少任意

葛氏方治口中熱于燦烏梅棗膏分等以蜜和丸如

乘舍之

藟發本草注云口于食喫柿

薩侍郎云若口干即校甘藟汁任服五分

治服石口中傷爛舌痛方第十一九

僧深方解散文子湯方

黃芩三兩 文子四枚 豉三升

凡三物咬咀以水五升先煮文子黃芩令得三升

絞去滓乃內豉煮令汁濃絞去滓平旦服一升日三

匡甚良

本草卷之九

十一

治服石口中發瘡方第十二

曹欽玄口中生瘡舌強服文子湯在上

僧深方玄餅散失節度口中發瘡方

黃芩三兩 升麻二兩 石膏五兩 末

凡三物以水六升煮取三升去滓極冷以敷口中日可

十過 小品方若喉咽有創補之佳

小品方治口創小藥湯方

龍膽三兩 黃連二兩 子蘗四兩

凡三物以水四升先煮龍黃連取二升別漬子蘗

令水淹シタ潛投湯中和ホトホシヒトシ稍含之シム

英漢文

治脹石心噤方第十三

病源論云其寒氣盛勝於ツクヘ勢榮衛ツクヘ不フナリ通寒セ

氣內結ル於心故心腹痛而心噤ツクヘ寒也其狀心腹痛而寒

噤不能言是也ツクヘ

僧深方云解散人參湯常用驗治心噤或寒噤不解ツクヘ

方

人參二兩カフヂモ 干薑一兩オホハシカア 甘草三兩マニヤ 伏苓一兩フシモト 栝樓二兩カラヅウリ

白朮一兩ソケヲ 枳實一兩カサタチカア

足方

ト二

凡七物水六升煮取二升五合分三服

秦並祖云療散致酒方散發不解或禁寒或心痛
心禁皆宜服之方用

葢較二升

勿令有極

凡一物禁令香以三升清酒投之沸

漉取

溫服一升小自溫煖令有汗意若患禁不可取

汗者但服之不必期令汗也

治服石心腹脹滿方第十四

病源論云居處犯致令石勢不宣內壅太府藏與氣相

搏故心腹脹滿也

皇甫謐云或腹脹欲決甚者新衣帶坐寢處久下契
又衣濕失食失洗不起行促行飲契酒冷食叁洗當
風梯梳而立

僧深方解散三黃湯治散發心腹痛脹滿卒急方

大黃 黃連 黃芩 各三兩

凡三物以水七升煮取三升分三服得下便心

今案三黃湯三出小品方在上除契篇

小品方云三黃湯治散盛契實不除心腹滿小便赤

大行不利地逆充胃中口焦燦目赤薰契方

黃連二兩

黃芩二兩

大黃黃二兩甘草二兩

芒消二兩

凡五物以水五升

煮取二升半

內芒消

令洋分三服

治腹石心腹痛方第十五

病源論云葦間有寒胃管有熱寒熱相搏氣逆

攻乘心故心腹痛也

皇甫謐論云或心痛如錐刺坐當食而不食當洗而

不洗寒熱相交氣結不通結在口中口噤不得息當

校口授與熱酒任本性多少其令酒兩得行氣自通

得噫因以冷水洗淹布巾著所苦處溫復易之

於其天根聲也

ヒシモ

ナク

ヘヨ

七カニテ

自解之便速冷食能多益善若大患著衣小使溫之ルシム
便去衣即差於諸痛之中心痛最為急者救之若ハクハ
若赴湯火乃可浴耳

小品方云治散發心痛腹脹兼冷動勢相格ハレシ不消甘草古伯文數下已見用也正也

湯方

小品方桔梗

甘草二兩

粘樓二兩カラルウリ

木二兩

枳實二兩

文子合兩クナシカネ

凡五物以水七升煮取二升分三服ヒ

又云單行甘草湯方中陰平丸ノ藥ナリ等アリ

甘草四兩

凡一物以水五升煮之析半冷之頓服盡當大

吐患心腹痛脹諸藥无効者宜服此湯

張仲景方玄黃芩湯治散^散發腹内切^{キリ}痛方

炙子二兩 香豉三升 黃芩二兩

凡三物切^切綿裹以水九升煮取三升分三服以衣

覆卧之應有汗

僧深方玄若散^散發患口噤心痛脹^六葱白豉湯方

葱白半斤 豉三升 甘草二兩 生麦門冬^{去心}罌

凡四物以水五升煮取二升分再服^三一方加茱萸一升

治脹石腰脚痛方第十六

特忍苦下地

時忍之下同

病源論云腎主腰脚脹石熱歸於腎若將適失
度發動石熱氣乘腰脚石熱與血氣相擊故脚
熱腫痛也其狀脚煩熱而腰痛也

皇甫謐云或脚疼欲折坐タシヤム下溫シタ宜常坐寒床以冷水洗チ起行又云或腰痛欲折坐シタ衣厚シタ弊溫以冷水洗チ冷石熨之ウセ

治服石百葶痛方第十七

皇甫謐云或百葶チ酸痛坐チ卧下大厚チ又入溫被中又

衣溫不脫故卧下當極薄大要也被チ當單布不著チ

皇甫謐云

ト云

綿衣フク二當薄ク且垢アタリ故勿著キル新衣宜著故フルキ絮也タタ

雖冬寒當常裯ナホ頭カサ受風ヲ以冷石熨衣帶ツミ初不

得繫也若犯此酸阿者セ促入冷水浴勿忍病而畏

浴也

槌要方云脹乳石不得將慎衡契失食憎寒頭痛ニラム

百節痠疼素良み疾痛也口脣乾カキ燠カハ舌卷方

知母ヤブシ八分 石膏シライシ十三分碎升麻トコナ六兩 通草トケ八分硝

石八分湯成竹青皮下六分 露蜂房ハチラ二枚灸

切以水二大升剪取九合食後分溫三服

土
 山
 岸
 山
 朋
 白
 又

小品方玄解散二物麻子頭欬湯治人虛勞下焦有

契骨莖疼煩肌急內圯兒小便利大行數少吸

口^キ煖^ニ少^シ氣^キ折^セ石^シ契^ケ方^{ホウ}

豉二升 麻子五合

檀取人

擗力推也

凡二物研麻子又以水四升煮取一升半分服五合

日三便愈神驗

治脹石辛^{三九}足^{ナリ}逆^{ナリ}冷方第十八

石論云治解散胃中有契千足^三逆^九冷苦寒甘草

湯方

甘草一兩

槲皮二兩

凡二物水三升モ煮取一升半以綿綿著頭著數取汁シ

服セ須臾間復服不可廢食食

治服石面上瘡方第十九廿

廣濟方云石氣發熱身體身痲腫腫面上瘡出方方

寒水石以冷水中中研令汁濃將塗瘡乾即點勿停ト

治服石身體生瘡方第廿十九

病源論云將適失宜外有風耶内有積熱風乘於面面

氣擁滯滯故使生瘡瘡

千金方云治散發瘡痛不可忍方

砒石五兩 一味下篩粉瘡上燂痛須臾靜定今檢本草

陶注云滑石一名砒石

天玄散發生細瘡方

黃連カクアタセ 芒消マウセウ 各五兩

二味水八升煮黃連取四升去滓內芒消以布取カクモクセ 括カク

瘡上敷易之カハ

小品方云治通身發創カセ 壁折經日用水不得息者方

劉胡荽煮溫洗漬ツバハナモア 尤良冬取根煮飲之ツバハナモア

劉胡荽

二

録驗方玄餅散爛創洗湯方

黃連 半升

苦參

黃芩 各半升

凡三物以水二斗煮取一斗去滓極冷洗之日三

新録方玄散發瘡方

水研大麻子塗日二三

又方水摩蔓菁子塗

日二三

又方水和豉研爲泥塗上日二

秦丞祖療散發熱創三黃膏方

大黃二兩

黃連二兩

黃芩二兩

凡三物以好苦酒漬之足相淹一宿猪膏二斤

火煎三沸輒下去滓摩之

又云庵散浮在肌膚作瘡方

子藥黃皮末下菰雞子白和如泥先煮子藥汁

泔洗却以傅之不過再便愈

治服石結腫欲作癰方第廿一

錄驗方云解散除契結腫緊起始欲作癰大黃

湯方

升麻大黃

夕藥

枳實

黃芩三兩甘草當

當歸ヤブセリ各一雨

凡七物以八升水煮取二升半分三服下腫即消
小品方云

升麻

湯

治服石癰疽發背方第廿二

千金方云癰疽發背皆由服五石寒食更生散所致

亦有單脹鍾乳而發者又有生平未服石而自發者

此是上世有服之者其候稍多

又云煮生者小覺背癰有異尋取淨

去火和作粥飯子作一寸半厚二分以

都念云

蘆艾作炷灸^{ツク}上灸之一炷一易餅子^{モトケ 九ヨ}若

粟米大^{オヒキセナラム}時可灸七餅^{セシ}若如榆莢^{クセラ}大灸七^{セシト}

炷即^{イニヌ}暑若^{シラ}至^ニ錢許大^ニ日夜灸不住^{セム}即^ト美^{イニヌ}

又云恒冷^{イコ}水射之漬^{イコ}冷石^{イコ}熨之^{イコ}日夜勿止^{イコ}待^{イコ}老^{イコ}住^{イコ}手^{イコ}

龐氏論云凡諸^{イコ}服草石散者^{イコ}皆不可灸^{イコ}身體^{イコ}令^{イコ}

人^{イコ}患^{イコ}發^{イコ}瘡^{イコ}也^{イコ}若^{イコ}體有瘡^{イコ}不可^{イコ}溫治^{イコ}也^{イコ}唯^{イコ}以^{イコ}水^{イコ}

漬^{イコ}布^{イコ}帖^{イコ}之^{イコ}燒^{イコ}李^{イコ}中^{イコ}人^{イコ}作^{イコ}膏^{イコ}以^{イコ}摩^{イコ}瘡^{イコ}上^{イコ}諸^{イコ}洗^{イコ}如^{イコ}故^{イコ}

薩^{イコ}侍郎^{イコ}云^{イコ}若^{イコ}發^{イコ}瘡^{イコ}及^{イコ}腫^{イコ}但^{イコ}服^{イコ}五^{イコ}香^{イコ}連^{イコ}翹^{イコ}湯^{イコ}等^{イコ}

惡^{イコ}脈^{イコ}
方^{イコ}

又云若腫有根堅如鐵石帶赤色者脹湯仍以小艾炷當腫上灸一兩炷為佳

治脹石身體腫方第廿三

皇甫謐云或周髀患腫不能自轉從坐久停息不

飲酒藥氣沉在皮膚之內而脈不通故也飲酒冷

洗自勞行步即極不能行者使健人扶曳行之

秦越人方云九藥發之後身髀浮腫多取冷所

致甘草湯方

甘草三兩灸艾子十四枚

凡二物以湯五升煮取升半分再服セミ

又云療散茺赤腫ハシ、怙方

黃芩ヒツシヤク四兩 鷄子ニ四枚 吳茱萸カラハシクアノミ四兩

凡三物搗下フラクフルフ篩セミ以水一升合鷄子ニ白ニ於器攪カキマゼ之

令沸出セミ染巾ハレタル怙腫上アタヘカサアハ溫復易カヘヨ之數十過

千金方云若使脚腫ハシ向上ヤシ稍進入腹則斂人方

赤小豆ハシ一斗以水三斗煮爛出豆アキ以漬脚膝ハシ以下日

一數日ハシ為之愈矣イヌヌ

又云若已入腹者不須漬煮豆食之ハシ斷一切薑菜飲食ハシ

胃心方卷十

十

米麴メバ唯タラハルキ只食豆一物セ渴飲汁セ老乃心イヌ

又云散發赤腫シ摩膏方ル

生地黃五兩ルニ 大黃一兩ナホシ 木人冊枚本 生章陸三兩イホ

四味切ル酢漬ヒタシ一宿猪脂アフラ一升シ煎章陸イホ黑去滓クハ摩之ル

三夜一

治服石身體強直ナ方第廿四

皇甫謐云或開節強直不可屈ル申坐久傳息不自ルニ

煩勞セ藥氣カ膝カド心氣結而不散ル起ヲ沉滯シ於血脈中故ル

也任力自溫便冷洗ル昂差任力自溫者令行動出力ル

足勞則發溫也非厚衣近火之溫也

釋慧義云治寒瘧似中惡手脚逆冷角弓反張

其狀如風或先熱後寒不可名字若先寒者用

冷水二三升洗脚使人將之先熱者以生熟湯四

五升許洗之若體中覺直者是散急服此湯方

栝樓根三兩 支子廿一枚 人參一兩 甘草一兩

香豉一升 石膏三兩 蔥葉三兩

凡七物細切之以水八升煮取二升半分三服

僧深方云治散發半死身體強直以手著口上如

尚有微氣即ハナハナ便兩人汲水灌之洗之兩三時同死者乃戰セハ便令人扶曳行便得食竟腹勞行半日許便愈此藥失節度所為似中惡解之方

黃連 大黃各二兩 豉一升 艾子人十四枚

凡五物以水七升煮取三升半去滓七升內豉更煮取三升三服タレ近有用此湯即得力也

治服石茛黃方第廿五

病源論云飲酒內熱ハナハナ日服石之熱又熱ハナハナ搏脾胃之氣主其色黃而候於肌肉積熱蘊結發於肌膚故

成黃

錄驗方治散莢戎黃莢凡熱毒胃中熱氣煩悶十モア

莢湯方

葫莢一切把凡一物以水七升煮取二升半分

再服一二劑便愈亦治通身ニ莢黃終日用水ニ

不得息者ヲモル濃煮大莢ヲモル適寒溫トシテ自洗シテ漬シテ

尤良ヨシ

新錄方治發黃者ハツ搗ハツ蒼耳取汁シ服一升日一ニ

今案服紫雪紅雪等可下去積熱ト

治服石^{上石丸}噎^{上石丸}逆方第廿六

病源論云將適失宜脾胃虛弱者石^石契^契結滯乘^{シテ}於脾胃致令脾氣^胃不和不勝^{カタ}於穀故氣逆^シ而嘔^{タツ}謂之^フ噎逆也

秦^ア祖^ツ玄芒消丸治散患積契^二逆^一噎方

芒消^{和ウセウ}三兩^{ナホ} 大黃^{ナホ} 三兩^{ナホ} 杏人^{カヲモウヒネ}三兩

凡三物各別搗^{キクタイ}治先末大黃芒消下^シ後^カ搗^フ

杏人^{ヒネ}子^ア令^{ナラ}如膏^{ナラ}乃合三物以蜜丸^{セヨ}服^{セヨ}如梧子^{キリクア}二丸

日二多少隨意消息之^{セラ}

小品方玄餅。發散振動煩悶。欬逆。人參湯方法議。

道人所增損方用如此。

人參二兩 甘草二兩 木二兩 黃芩一兩 枯樓兩

九五物以水七升煮取二升分三服

治脹石欬味方第廿七

曹欬論云欬逆。目痛。鼻中窒塞。清涕出。本皆是中

冷之常候也。而散契亦有此諸患。冷欬者得溫是

其宜也。若是契者得酒於理當美和也。欲分別之者

飲冷轉劇者果是冷欬也。飲冷覺佳者果是藥

熱欬也

皇甫謐云或欬逆咽中傷清血出坐卧温故也或食

温故也飲冷水冷石熨咽外今案紅雪方云療一切丹石蔽熱上氣喉味苦病者逆和水服之

秦羌祖云療散欬嗽膽嘔胃中冷先服散感不得

服熱藥杏人煎方

杏子中人廿枚カフモウ 白蜜六合セネ 些菟一兩フシ 于薑一兩オホハシカミ 牛脂ハカリ

凡五物治合下ククキ 篩フル 和以蜜ハル 微火煎シ 令可丸シカラ 如梧子服シキリツアセ

九日三老小甚佳

治服石上氣方アケル 第廿八ハル

病源論云脹散將適失肝溫大過契搏管衛而氣逆

上其狀胃滿短氣是也

僧深方竹葉湯治散發上氣方

生竹葉二兩 甘草一兩 黃芩一兩 大黃一兩 文子十枚

伏苓一兩 干地黄六分

凡七物以水五升煮取二升一合服七合日三

治脹石淡澤方第廿九

病源論云脹散而飲過度將適失宜衣厚食溫即

飲結成淡澀其狀淡反則胃羣否滿頭眩痛心脇

結十九 愆急是也

皇甫謐云惡食如憂物生溫衣作禪也當急下之タカシ若

不下ヨロシ萬救終不老也シ 謹公日以三黃湯下之セイ

僧深方肥散家淡胸胃心下有胆ハク淡客熱者吐之方ハク

甘草五兩以酒五升煮取二升半分再服セウ欲吐者便セハ

快蕩去ユハラクシ 飢チチ

小品方云白薇湯治寒食藥トキハ 藜蘆中澹酢ヒナ 于欬煩ネハラヒ

方

白薇二兩 半夏二兩アハシユグセ 洗ホソクヒ 于薑二兩 甘草半兩

凡四物以酢五升煮取三升分服五合夫酢酒能令

石朽爛

治服石不能食方第卅

張仲景云半夏湯治散莢于漱不食飲方

半夏八兩

洗炮

生薑十兩桂心三兩橘皮三兩

右四物以水七升煮取三升半分三服一日令盡

治服石酒熱方第卅一

小品方治酒熱法積飲酒石熱曰盛數散行經

絡中使氣力強腎家有熱欲為勞事々々使腎

虛則契盛ムナシカラ、心下滿口燂カキ、燂飲カキヲ能ク、隨飲吐不安飲食

也、宜飲葛根湯安穀神除契クハシネ、吐渴也ヤム

治脬石淋小便難方第廿二シタテハ一

皇甫謐云或淋不得小便坐久坐下溫及騎馬鞍中契

入脬シハ、脬故也大冷食以冷水洗少腹以冷石熨シハ、一日即心

僧深方治散シハ、發小便難其狀如淋方フセ

葵子アヲサア五合

凡一物以水二升半煮取一升一服晝須更便利也ハル

錄驗方云解散閉悶結小便不通如淋方

大黃オホシ一兩 麻子アサ人半斤 夕藥ソノクセ一兩 伏苓フツセト二兩 黃芩ヒキアキ一兩

凡五物以水五升煮取二升半分再服小品方同之

廣利方玄石氣頭煩熱口乾カキギ小便赤少方

露蜂房ハナツバ十二分炙

右以水二大升煎取八大合分溫二服セシ當利小便諸惡石

毒隨小便出

治服石小便不通方第廿三

病洩論云夫服散石者石契セル歸シ於腎而内生契ナ、結小腸シ

肥肥內否肥滯故小便不通也ルセ

小品方云解散小便不通神良方

桑螵蛸オキナラフシリ世救 黃芩ヒヨウキン一兩

凡二物以水一升煮取四合頓服之

錄驗方云解散利小便致良葵子湯方

三歲葵子アヲサシ一升 右一物以水三升煮取一升半冷暖隨意

頓食飲不能稍服セテ一方加滑石三兩

治尿石小便稠數方第廿四

皇甫謐云或小便稠數坐契食及散諸含契物餅黍

之故也以冷水洗少腹自心不老者冷水浸陰又佳若復

不解脹支子湯昂解

小品方云解散除契チ小便數少シヤウ單行ヒトヘ葵子湯方亦治

淋用不通シモ三歲葵子アヲキヲア亦可用

陳葵根切フシキ一升以水三升煮取二升アタカナル婦人肌稍脹之ヤシイダ

外臺方古支子湯

支子人チ二合甘草二兩クキ黃芩二兩ヒツキ芒消二兩湯成以水内之

五升煮取二升分溫二服取利即老

治服石小便多方第卅五

病源論云將適失度契在下焦トキハ虛冷ク氣乘セル於

胞故胞令不能制於小便則小便多也

新録單方玄鷄腸草煮為羹散之搗汁服五六合日

日二

又方棘直刺來針各三并搗篩蜜丸酒若飲服世

丸日二

治服石大小便難方第卅六

病源論玄積服散盛在內熱氣乘於大小腸否溢故

大小便難也

花他方解散契脹滿大小便不通方

枳實カウチツア四兩

由跋カイハツ四兩

凡二物以水二升漬之ヒタツ令藥滓ナラ尔乃煮得エ半升去滓ホノカレ稍ヤツ

ニ飲ラム多少シモ燼ウシ自老イユエマ

張仲景方治寒食散大小行難方ナレ

香豉クキ二升 大麻子オシロイ一升 破ホレ

右二物以水四升煮取一升八合去滓ホレ停冷一服六合日三

新錄單方ナラ云大小便難服エシ葵子アヲサヲア

錄驗方云若大小便秘塞不通セ或淋瀝ヒキ溺血イタキ陰中疼痛

此是熱氣所致ナリ熨之フセ則愈イユ

慰トヤナル法先以冷物トヤナル熨セ少腹冷トヤナル熨セ已復復以熱物トヤナル慰セ之

用有モ契セ物トヤナル熨セ已復冷トヤナル熨セ之

治服石太便秘難方第廿七

病源論云痔適失宜犯溫過度散契不宣トヤナル契氣積

在腸胃故太便秘難也

皇甫謐云或大行難腹中堅固如馳盤坐犯溫久積腹中

乾糞不去故也消蘓若膏使寒脹一二升浸潤則下不下

更服下藥昂菴蔭公曰若不下服大黃朴消等下之

秦美祖云朴消大黃煎治胃管中有燥糞大便難身

體發創解發方

大黃金色者ナレ二兩 朴消ソ細白者ナレ二兩

凡二物以水一斗煮減シ三升去滓カレ著銅器中於湯上イ燉タチ火上シ煎令可丸シム病人ツヨキ弱者タチ可頓吞ツケ羸人ツケ中脘ハ可後宣ニ得ヲ羊肉カ君鴨セ廩肉ク養ア補ツ之ル

錄驗方解散不得大行方

大黃四兩 桃人ソ廿枚ヒネ

凡二物以水六升煮取二升二服一方大黃二兩桃人モ五ウ枚セ

治脹石大便壅方第廿八

新錄單方云散發大便壅者方

葱白切一升豉一升

水四升煮二升二脹

又方車前草切三升水五升煮取二升三脹

治脹石下利方第廿九

皇甫謐云或下痢如寒中坐行心食飲犯熱所致人多

疑是卒疾又有滯痺者皆犯熱所為慎勿疑也

速脫衣冷食冷飲冷洗或大便稠數坐久失節度將

死之候也如此難治矣為可與湯下之僅十得一生耳

不与湯必死しヌ莫畏不与也下已致死死トモ令人不恨セシムウツミ

小品方解散除契心利黃連湯方

甘草一兩 黃連二兩 升麻トリノアシクセ一兩 艾子十四枚

豉五合 凡五物以水五升煮取一升半分再服ヒ

豉五合 凡五物

秦蘂祖玄黃連丸解寒食散ツキ多能大注下腸田ヲ滑方

黃連フルヒ蘂フルヒ成屑三升 烏梅ホシム百廿枚 去核セシ

凡二物治合下フルヒ蘂以蜜和之更ツク鵲三千杵コトシ丸如梧子ハカリ服

廿九日可十服病甚者一日可至三四百丸

新録方玄散葢下利者服牛羊酪一升曰二

又方水和大麦及米^ユ越服^ヨ一二升

又方致三升水四五升漬^{ヒタシ}經宿或煮三四沸^{セシ}冷服^{セシ}一升

曰二三昂^{クエヌ}新

治服石^{ヒル}熱渴方第卅

病源論云夫服石之人石^{ヒル}熱^{ヒル}歸^シ於^ニ腎而^テ熱^{ヒル}充^ア府藏^シ
既^シ熱^{ヒル}津液^シ竭^ケ燄^{ハク}故^ニ渴^シ引^ク飲^ク也

小品方治散熱^{ヒル}盛渴^シ方

生地黃一斤 小麦二升 竹葉^ヲ切^{ヒル}二升 芍^ク杞^{コウ}根^ネ一斤

凡四物切以水一斗煮取九升渴者飲之セ

又云吕万舒解熱心渴飲地黄汁方ハシ

生地黃一斤 小麦三斤 芍杞根三斤

凡三物以水三斗煮取二斗汁渴者飲之ヲメ

又玄單行芍杞白皮湯解散除熱止渴方トシ

芍杞根白皮十斤以水三斗煮取一斗分服一升

治服石冷熱不通方第卅一トシホフ

僧深方解散人參湯治散發作冷熱不通方カゼハ

人參二兩 白朮二兩 枳實二兩 桔樓二兩カシノコ

干薑二兩

甘草二兩

凡六物以水八升煮取二升半分三服

治服石補益方第卅二

秦^{中治本元}姜^{參里八つ}祖^同云當歸九治散發

錄驗方解散除胃中熱益氣竹葉湯方

竹葉二兩 甘草十兩 白朮一兩 大黃二兩

凡四物以水七升煮取二升半分五合一服

又云生地黃並補虛除熱^ル將和取利也

僧除方解散散內補治百病^ル巨勝湯方

胡麻ウズナ一升糞

生地黄一升切

大棗ナツメ廿枚

夕藥モロコシ一兩

生薑イシクア四兩

甘草一兩 麥門冬マクモト四兩

桂心一兩 人參カラニナクモ一兩

細辛ヒコウ一兩

凡十物以水九升煮取四升分四服

新錄方散發動後虛內補方ル

苟杞ヒトヘ煎單フクアヲヌ含咽モ、倪モ、ハカガ、ヒ如桃李カシヲモナラム許日二三粥飲中ヒヤカシ二好ヒヤカシ卷

難散ヒチヲヌ酒服ヒチヲヌ忌鯉ヒチヲヌ莫虛ヒチヲヌ契人並得ヒチヲヌ領之ヒチヲヌ

治服石經年更發方第卅三

小品方云蒼朮湯トク華他解藥毒或十歲或廿歲而發

契或燂トク如寒欲得食飲或不用飲食華他散法

有石流黃エウアハ熱鬱ナカク如熱澆洗失度錯服ナカク藥劇ナカク

者ナカク梓裂ナカク礬石ナカク熱ナカク燐ナカク如戰ナカク紫石英ナカク熱ナカク同ナカク周ナカク害ナカク卧ナカク

起ナカク元氣ナカク力ナカク或時欲寒ナカク皆是府氣ナカク所生ナカク藏氣ナカク不和宜服

此湯

薺ナカク薺ナカク四兩 甘草ナカク一兩 人參ナカク一兩 藍子ナカク一兩 伏苓ナカク一兩

夕藥ナカク一兩 黃芩ナカク一兩 無菁子ナカク三升

凡八物ナカク切ナカク以水ナカク一斗先煮ナカク薺ナカク菁子ナカク得八升ナカク絞去滓ナカク煮藥

得三升ナカク半分脹ナカク七合日三若躰寒倍ナカク人參ナカク減黃芩ナカク用

半兩也若氣嗽倍ナカク伏苓ナカク減薺ナカク去一兩

藥石ナカク生
耳大熱ナカク生
若濕熱ナカク生
熱ナカク已

又云應楊州所得吳解散單行葱白湯方藥沉體
中數年更發治之方

生葱白一斤凡一物以水八升煮取四升分服一升使一日
盡之明日便當溫食飲於被中後發便為知也不

過三劑都愈也

又云治散熱氣結滯經年不解數發者方

胡荽半斤

凡一物以七升煮取二升半分作三服盡一劑便愈

醫心方卷第廿

醫心方卷第廿札記

一頁下 四行 欲作無仁和尚本

二頁上 八行 龐氏論此一頁已見

篇中又 少異 九藥無仁和尚本

下三 懷之也十九卷引此

發之候 七字 五 無脉也十九卷引此 下有唯氣 七 先食

仁和尚本先 作洗病源同 八 外臺方云所引外臺今見第 三頁 上

行 取瓷外臺瓷 八 乾藍千金同 仁和尚 下七 二升半

仁和尚本 無半字 八 塞急無仁和尚本 四頁上 又云解散以下

九行仁和尚本無與舊 三 地達外臺世八卷引薛侍

地即否改字廣韻 下二 石勢仁和尚本 八 三兩和

寺寺作五頁下 二雨四行 祝米赴祝航之異構赴訛赴 仁行八

立驗仁和尚寺本 六頁下 二升半仁和尚寺本 三宣犯

犯仁和寺本 七行 今案以下注文 仁 七頁下 即得和

寺寺無九行 曹欽以下四十字 五曹欽云以下十三

無九行 洗之仁和寺本 又云以下十七字 九頁下

皇甫謐云以下一段已見第九卷互複今不一 九云

發仁和寺本 十頁上 曹欽云以下十字 仁 四契

勢仁和寺本 下五 冷水仁和寺本 八粥漿仁和寺

葛氏方以下廿三字 十一頁 蘓敬以下十一

卒 下二 曹歙云 仁以下十五字 八小品方云 此一跋

卷第一中 九地蓮 仁和尚本同而傍 下五 攻乘 仁

此蓋重出 行 有腹字 八令酒 仁和尚本 上十四頁 粘樓 仁和尚

枯 八又云 仁以下四十五字 行 下六 患口 患恐 十五

三其狀 仁和尚本 八又入 仁和尚本 下八 露蜂

房 仁和尚本 四行注 插取 仁和尚本 十七頁上

今檢 仁和尚本 八擘折 仁和尚本 上十八頁 癢散 療

癢 仁和尚本 下四行 轉從 仁和尚本 七頁上 脚

膝 仁和尚本 下三 水人 舊校引或本木作 生章陸 仁

學子方氏士已

奇本章作

商千金同

行猪脂

仁和尚本

行散起

十九卷第四

作越与舊校

廿一行

人將

或曰義為輔

廿一行下

各二兩

仁和尚本

行結發

仁和尚本

廿一行

急

仁和尚本

廿一行

服畫

畫盡之俗

七

行散盛

仁和尚本

大小腸

仁和尚本

廿八行

單方

仁和尚本

行淋瀝

仁和尚本

下七

若膏

仁和尚本

石

廿九行

可後

仁和尚本

六行

寒食

仁和尚本

字

下二

米赴

仁和尚本

三行

又方致

仁和尚本

一

四行

秦美祖云

以下十字

當歸九

九

行十兩

仁和寺作一雨

世二夏下一行如契如而通下戰同

二英勢行仁和寺作契

醫心方卷第廿一

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

肝
也
玉篇
五
百
也
文
和
氣

婦人諸病所由第一

治婦人面黑ハクシ肝方第二上卷第百一十

治婦人面黑ハクシ子方第三上卷第百一十

治婦人妬乳チフ方第四妬乳也

治婦人癰方第五乳上

治婦人乳創チフ方第六乳上

積不通

治婦人陰癢方第七カニ

治婦人陰痛方第八カニ

治婦人陰腫方第九カニ

治婦人陰瘡方第十カニ

治婦人陰瘰肉方第十一カニ

治婦人陰冷方第十二カニ

治婦人陰臭方第十三カニ

治婦人陰脫方第十四カニ

治婦人陰大方第^{ナレ}十五

治婦人小戶嫁痛方第^キ十六

治婦人陰丈夫傷方第^{ナレ}十七

治婦人脫肛方第^{ナレ}十八

治婦人月水不調方第^{ナレ}十九

治婦人月水不通方第^{ナレ}廿

治婦人月水不斷方第^{ナレ}廿一

治婦人月水腹痛方第^{ナレ}廿二

治婦人崩中漏下方第^{ナレ}廿三

治婦人卅六疾方第^{ナレ}廿四

治婦人八瘕方第^{ナレ}廿五

治婦人遺尿方第^{ナレ}廿六

治婦人尿血方第^{ナレ}廿七

治婦人瘦弱方第^{ナレ}廿八

治婦人欲男方第^{ナレ}廿九

治婦人鬼交方第^{ナレ}卅

治婦人令新生產方第^{ナレ}卅一

婦人諸病所由第一

千金方云論曰夫婦人所以有別方者以其血氣不調

胎任產生崩傷之異故也所以婦人之病比之男子

十倍難療若四時節氣為病虛實冷熱為患者

与丈夫同也唯懷胎任疾病者避其毒藥耳

又云女人嗜欲多於丈夫感病則倍於男子加以慈惠

愛憎嫉妬憂恚深著堅牢情不自抑所以為病根

深療之難差故傳母之徒亦不可不學

小品方云古時婦人病易治者嫁晚腎氣立少病

不甚有傷故也。今時嫁早，腎根未立而產，傷腎故也。是以今世少婦有病，必難治也。早嫁早經，產雖无病者，モウ也。九

治婦人面上黑_九肝方第二

病源論云：婦人面上黑，肝者，或藏府有痰飲，或皮膚受風邪，血氣不調，致生黑。肝若皮膚受風，外治則

姜府藏有飲，內療方愈。

僧深方治婦人面_九肝方

取伏苓治莖蜜和以_九漆面日四五

又方取桃人治ツネ獲鷄子白和以塗面日四五スル

經心方治面疔方

取杏人未和鷄子白カラム、ツネ傳之一宿即落ハツ

治婦人面上黑子方第三ハダク

病源論云婦人面上黑子者風邪搏血氣變化所ハダク

生如意方去黑子方ハダク

烏賊魚骨イカノユリ細辛キハヒヒ枯樓カスルリ干薑オホヒカア蜀椒オホヒカア
依蒂 或李有之

分等苦酒漬三日牛髓一介シホリ煎黃色紋以裝ヨシク

面令白悅去黑子ハダク面疔黑子方ハダク

詳在上快四卷

治婦人妬乳方第四

病源論云婦人妬乳者由新產後兒未飲之或飲不能
泄或新斷兒乳捻其乳汁不盡皆令乳汁畜結
與血氣相搏則壯熱大渴引飲穿強制手痛手不得
近是也初覺便以手助將去其汁并令傍人助吮引之
不令成創有膿其熱勢盛則結變成癰

小品方治妬乳方

以鷄子白和小豆散塗乳房令冷以消結也

又方

黃芩

白薇

夕藥

三物分等下篩シタ以漿脹錢一邊五文上日五服集驗方同之

又云宜以赤龍皮湯又天麻草湯洗之ハナハ傳黃連胡粉膏ハナハ

赤龍皮湯又樹皮切カシハ三升以水一斗煮取五升夏月

冷用之心秋冬溫之心分以洗乳カキマカハ

天麻草湯又天麻草切ハナハ五升以水一斗煮取一斗隨

寒溫分洗乳ハナハ今案耆婆方菴蔚一名天麻草

葛氏方治婦人妬乳ナラ腫痛方ナラ

治李元方醫書本有削取柳根皮ハナハ契鴉火溫帛ナラ裹熨上冷更易カハヨ

又方梁上塵ハナハ苦酒ハナハ和塗ハナハ又治陰腫ハナハ

又^{方し}未^{ニシ}地榆^{カハ}白皮^{カハ}苦酒^{ニシ}和^ハ傳^ハ

又^{カア}方^{ニシ}白^{ニシ}芡^{ニシ}夕^{ニシ}藥^{ニシ}酒^{ニシ}服^{ニシ}方^{ニシ}寸^{ニシ}匕^{ニシ}又^{ニシ}可^{ニシ}苦^{ニシ}酒^{ニシ}和^{ニシ}塗^{ニシ}之^{ニシ}

又^{オホハ}方^{ニシ}罌^{ニシ}婦^{ニシ}虫^{ニシ}以^{ニシ}塗^{ニシ}之^{ニシ}

又^{オホハ}方^{ニシ}車^{ニシ}前^{ニシ}草^{ニシ}搗^{ニシ}苦^{ニシ}酒^{ニシ}和^{ニシ}塗^{ニシ}之^{ニシ}

產經妬乳方

取^{ニシ}牛^{ニシ}矢^{ニシ}燒^{ニシ}末^{ニシ}以^{ニシ}苦^{ニシ}酒^{ニシ}和^{ニシ}塗^{ニシ}上^{ニシ}

又^{ニシ}方^{ニシ}左^{ニシ}乳^{ニシ}結^{ニシ}者^{ニシ}去^{ニシ}右^{ニシ}乳^{ニシ}汁^{ニシ}右^{ニシ}結^{ニシ}者^{ニシ}可^{ニシ}去^{ニシ}左^{ニシ}乳^{ニシ}汁^{ニシ}
集驗方同之

集驗方治妬乳方

急^{ナラ}灸^{ニシ}兩^{ニシ}手^{ニシ}魚^{ニシ}際^{ニシ}各^{ニシ}二^{ニシ}七^{ニシ}壯^{ニシ}新^{ニシ}臍^{ニシ}脉^{ニシ}也^{ニシ}

又方以鷄子白和小豆散塗乳房令消結也

又方取葵莖搗篩服方寸匕日三即愈

又方鴉生地黄薄之契則易

治婦人乳癰方第五

病源論云婦人乳癰者腫結皮薄以澤是為癰也

寒搏於血則凝不通而氣積不散故結聚成癰亦曰

乳汁畜結与血相搏溫積而成癰也乳癰年卅已

還治之多愈年五十已上慎不當治之多死乳癰久

不老曰變為癰養生方云婦人禁食汗出露乳蕩

風毒發腫名吹乳日毒作癰

風毒發腫名吹乳日毒作癰

小品方治乳癰方

大黃二分 茵草二分 伏龍肝二分 生薑二分

凡四物合篩以薑併春治以醯和塗乳有驗

范汪方治婦人乳癰方

大黃治篩和生鷄子溲腫上燂復更傳不過三愈

又方竈中黃土以鷄子黃和塗之又方熬粉水和

傳之又方大黃麻角二物分等燒麻角与大黃篩

以鷄子白和恬之

僧深方治乳癰方

赤シキハタ黃蘗シ鷄子白シ和塗之 又方搗ソ行根ネ薄之ハナク

又方赤小豆末鷄子白和薄之

又玄治婦人乳癰生核積年不除カク消核エンシヨ防風薄方

茵草シヤン八分ハツ 芎藭ニ八分ハツ 大黃オホニ十分ジュウ 當歸ヤエ十分ジュウ

防風ハツ十分ジュウ 夕藥エヒル十分ジュウ 白薇ヤエ十分ジュウ 黃耆ヤハ十二分ジュウニ

黃連カク十分ジュウ 黃苓ヒメ十分ジュウ 枳子カラシ中人チウ四分シ

十一物治諦以鷄子白和塗シ故布ハナク若練上ネリキ以薄腫上ツク

日四五夜三

千金方乳癰二三百日衆療不差但堅カク紫色方カレ方

柳根ネ削上サハハカ皮搗イリ熬メウ令溫モリ盛モリ囊モリ熨乳上集驗方云一宿則愈

璧門方療婦人乳癰初得令消方

赤小豆シキア 苧草各分シ等シ苦酒シ和塗之シ立愈タキトニロニ

龍門方治乳熱腫方

冷石熨之ヒツカテ差シテ又方取朱書乳作魚字ヒツカテ驗ア范汪方同

驗錄方治乳癰堅如石衆醫不能治方

桂心二分 烏頭二分 甘草二分

凡三物治合淳酢和塗腫上

產經乳癰符臈

用新筆朱書腫上

又方取焦凡搗碎和酢塗之立差千易

治婦人乳創方第六

病源論云此謂膚湊虛有風濕心氣乘虛客之與血氣

相搏而契加之則生創

范汪方治乳端生氣出汁痛方

麻黃二分燒甘草一分治合和鷄子黃量煖灰

上令溫日二傳之

聖門方療乳頭裂方搗丁香傳之立差
今案崔侍

僧深方取ミナノネ薤根ニラノネ燒粉バシ創良

集驗方婦人女子乳頭生小淺熱瘡カク搔之ユル黃汁出浸淫シム

為長百治不差者種トモル經年月名為乳病乳

宜以赤龍皮湯及天麻草湯洗之五ヤイタ傳二物飛バクゴ為

膏及飛為散飛為膏方用燒朱沙作水銀上黑五ヤイタ

煙名汞粉胡粉者三兩胡粉繫石三兩胡粉焚令焦二物下篩以甲

煎和之如脂傳乳瘡日三作散ツルナキハ不須和有汁有目著モトナ

者可用散カク傳諸熱瘡黃爛浸淫汁瘡瘡カキ丈夫

陰蝕瘡カク濕小兒頭瘡月食耳瘡口邊肥瘡ハミ蝸

燒時花看
金上灰名
永粉

瘡志効

又云若始作者可傳黃連胡粉散佳

黃連胡粉膏散方 黃連二兩胡粉十分水銀二兩

凡三物末黃連令消以二物相和合皮裏熨棧

之自和合也縱不成一家且得水銀細散入粉中也

以傳乳瘡諸濕癢瘡若著甲剪為膏

治婦人陰瘡方第七

病源論云婦人陰瘡是虫食所為其虫動作勢微故

令瘡若重者則痛

醫心方卷十一

葛氏方婦人陰若苦痒搔者方

蛇床草節刺燒作灰內陰中

孟詵食經婦人陰癢方搗生桃葉綿裹內陰中日

三四易泔煮汁洗之今案煮皮洗之良

錄驗方治婦人陰癢方

槲コ杞コ根ネ切切一斤以水三升煮トシテ適寒溫洗之即愈カナチ

僧深方婦人陰癢方

黃連黃蘗各二兩以水三升煮取一升半溫洗旦

槌要方陰中及外痒痛方

大黃オホシ三兩甘草アサキ二兩水三升モ煮取二升ヒタシ漬洗ヘ日三

集驗方治婦人陰中痒如虫行狀方

礬石ホシ三分イシ煑ク芳ク藟ク四分オムナカツラ真丹マニ沙少ルミ許ハカリ三物下

篩以綿裹ハム內陰中オムナカツラ虫自死シ又

治婦人陰痛方第八

病源論云婦人陰痛之病カランノア藏虛風耶シ乘之トホリ衝擊ヒラキ而疼

痛而已

葛氏方婦人陰燥痛者方煮甘草カキ地榆オモミ及ナカ礬アハ以洗之エヒル

又方以塩湯洗之

醫心方卷十一

近齡圖云若陰中重痛灸枳實尉之良

治婦人陰腫方第九

病源論云陰腫者是虛損受風耶所為也

葛氏方婦人陰腫痛者

熬イセル礬石二分 大黃一分 甘草半分 未イシ以綿裹

如棗イカク核ヒネ以導アチヒイ之イシヨ近齡圖同之 又方灸枳實尉之

僧深方陰腫痛方

黃芩ヒツマキ一分 礬石ヒツマキ一分 甘草二分 下ヒツマキ篩ヒツマキ如棗ヒツマキ核ヒネ綿裹ヒツマキ內

陰中

治婦人陰瘡方第十

病源論云婦人陰創者由三虫九虫動作侵食所為也諸虫在人腹內腸胃虛損則動作侵食於陰輕者或瘡或痛重者生創也

葛氏方治婦人陰中瘡方

末流黃傳瘡上

又方燒杏人檮以塗之

又方末雄黃熬二分樊石二分麝香半分和末

傳之 同之 運發圖

樣要方治婦人陰瘡方 取桃葉鵝絞取汁洗之曰三

錄驗方治婦人陰瘡方

蛇床子一分ヒルハシロ 煖ヒ 大黃二分 胡粉半兩

下オロシテ丸ハカリ 師作散先以溫湯洗以粉ダシ 之

僧深方女子陰中瘡方

累ハム 棗ホレミヤク 石末シ 一ヒ 如棗核セホ イレタ 內陰中

范汪方婦人陰瘡方

地榆二分チヨ 甘草一分カンキ 水者ミヅ 適寒溫トク

洗之良シ

千金方婦人陰瘡方

狼牙ヨロイナキ 兩把切以水五升煮取一升コノミヤ 溫洗之アホカク 日五イハレ 次イハレ 廣濟

苦酒クシュ 煎塗洗ヌリ

又云治男女陰蝕略盡方カサホ

蝦蟇カヘル薤白ニクシク二味カケル分等搗篩フル以傅瘡上ハナフ集驗方同之

劉涓子方治婦人陰蝕カケル當歸湯方

當歸ヤブタチ二兩 甘草ハナハタ一兩 芎藭コウキウ一兩 芍藥オウゴン二兩 地榆チヨ三兩

右五物以水五升煮東三升洗之日三夜一

錄驗方丸ル治婦人男子陰蝕カケル及膿血ウツ不禁ヤ男子莖盡オモ入腹手也

中衆醫毛所不能治丸ル大黃湯方

大黃オホホ二兩半 黃芩ヒコウ二兩 黃蘗キハタ二兩半 復ホフク二兩 細辛ヒコク二兩

兩生地黃オホホ二兩 虎掌ヒコク一兩半 茵草ヒコク一兩半

凡八物以新汲井水クセル一斗煮取三升洗瘡若

陰裏病取練沽湯中著陰道中時復カハヲ

易半日佳惡汁盡當上ハナハナ濃コ當カ如ニ

針孔勿恠也ナナ

治婦人陰中瘕肉方第十一アノミ、又コケヤ

病源論云陰内瘕肉由アノミ、又コケヤ胞絡虛損冷熱不調風邪客之ナニ

耶氣乘陰搏於血氣變生瘕肉也其狀如鼈乳ナニ

葛氏方婦人陰中息肉突出者方ナニ

以苦酒三十漬ヒタシ焉ツク啄ツク五枚三日以洗之ツク日夜三四過之ツク

又方取猪肝炙ヒキモ熱アノミ內陰中即有虫出ツク著肝ツク

耶言似暑
又不定目
也謂非人身
之常理

治婦人陰冷方第十二

病源論云胞絡勞傷子藏虛損風冷客之冷乘於陰故令

冷也

千金方治陰冷令契方

內食菜羹牛膽中令滿陰干百日每取二七枚綿

裹之齒爵令碎內陰中良久契如火

又婦人陰冷痛方

灸婦人壯三報侯玉泉五寸是也

延齡圖云療婦人陰冷方石留黃三分蒲黃二分

玉門女陰也

右三味鴉節為末三指撮內一升湯中洗玉門當日急熱

治婦人陰裏方第十三

病源論云陰裏由子藏有寒氣搏於津液溫積氣

衝於陰故變裏也

逆齡圖云療婦人陰裏方

檳皮切一升甘草二兩當歸三兩右以水一斗煮取

三升去滓洗玉門內日二度洗如冷加麝床子并根二分

治女陰寒裏方

白薇一分桂心五分苦參一分甘草一分附子一分

吹咀上敷及下子傳施轉之義

五物吹咀水煮洗之愈

治婦人陰脫方第十四

病源論云胞絡傷損子藏虛冷下脫亦曰產用力陰下脫也

千金方治陰下挺出方

蜀椒ナルヘカア二分 烏頭ウカ二分 白芨カハ二分

三味篩以方寸匕綿裹內陰中入三寸腹中熱易之

又治陰脫イハル流黃散方

流黃ユホラ二兩 烏賊骨イカノコノア二分 五味子ヒメカラ三銖

三味治下篩以粉其上良日再三 葛氏方同之

經心方陰脫下方

樊石鷄子大二枚シホ塩彈丸大二枚ウキチチ二味以水三升煮洗之ツ

自入

葛氏方治婦人陰脫出外方

水煮生モ鐵シ令シ濃コ以洗之ヘ樊石ホシヤクモ良シ 僧深方同之

又方燒ヤイセウ蝾螈シヤウ末シ以猪膏アヲラシ和カ傅フ上カ補ホ黃ワウ粉コ之ノ

捷要方陰脫方ル取ル蛇床子ヘルクマシロ葵布イリ累ハム熨ナ之ノ 經心方同之ル

僧深方治婦人子藏ル挺出ヤル蛇床洗方ル蛇床子トクムシロ二升酢梅ル二七枚

二物水五升煮取二升半洗之トクセ日十過

集驗方治婦人陰中痒脫カキカリ下方取車釐膏傳之即差イユ

經心方治婦人陰挺出方九ル灸香中二壯愈イユ

治婦人陰大方第十五ナシ

逐齡圖云療婦人陰寬ヒラクヒヤタル冷令急小交接而快方ヒメカフメシ

石流黃二分青木香二分山茱萸二分蛇床子ヒルムシロ

二分右四物搗篩為末臨交接內玉門中少許ヒルムシロ

不得過多シエタ忌楫孔合ヒツカリナム

又云治婦人陰令成童女法シカル

蛇床子三分遠志三分石膽三分山茱萸三分ヒルムシロ

青木香三分 トキアセキセキセ 細辛半兩 桂心二分

右七味搗篩為散 晝猗膽中懸於屋內陰 イヌクイ カケ

乾六十日藥成 搗為末可丸如棗核大 暑婦人 ホニ丸ル ナツセホニ丸ル

陰中急小而契不過三日 アツカナリ

又方松上女蘿一分 礬石一分 石留黃一分 アハナコケ シノコ 石留黄

右三味分等搗篩為末 內陰中當日而急小 イニチ

甚妙

又方取石留黃末二指撮內一升湯水中以洗陰急 ハカリナリ

小如十二三女 ト

千金方治陰寬ヒロクナシム大令ルホクナシム近ナリカラ小方

芡ネハシカハラ系子二分 乾漆一分 鼠頭骨二枚 雌雞肝三枚

百日陰干

四味丸丸九如小豆初月七日令時ツツ一丸著陰頭ホトリ徐ヤヤク

內ナリ連三日知シル十日小五十日如十三女ナリ

錄驗方治女急丸九如童方クセクセナスト

食茱萸三兩特牛膽オホメヲスニ一枚 石塩イヌホ一兩

搗茱萸下ル篩內牛膽中又內石塩イ著膽中ツツ

陰カンホシ干百日戲ル時取如鷄子黃末著女陰中

即成童女也

治婦人小戸嫁痛方第十六

集驗方治童女始交接陽道連理及為他物所傷血

流離不心方 取金底黑新葫摩以塗之

又方燒髮并青布末為粉之立愈 葛氏方麻油和塗

千金方治小戸嫁痛方

烏賊骨二枚燒為屑酒服方寸匕日三

又方牛膝五兩一味以酒五升煮再沸去滓分三服

玉房秘決云婦人初交傷痛積日不歇方

甘草二分 芍藥二分 生薑三分 桂心一分 水二升煮

三沸一服

治婦人陰丈夫傷方第十七

集驗方治女子傷於丈夫四體沉重喘吸頭痛方

生地黃八兩 芍藥五兩 香豉一升 葱白切一升 生

薑四兩 甘草二兩 切以水七升煮取三升分三服不

差重作

千金方治合陰陽輒痛不可忍方

黃連六分 牛膝四分 甘草四分

三味水四升煮二升洗之日四

又女人交接輒血出方

桂心二分伏龍肝三分二味酒服方寸匕日三劉涓子方同之

玉房秘決云女人傷於夫陰陽過患陰腫疼痛欲飲方ハシヒトミヤイザイヤムト

桑根白皮切半升干薑二兩桂心一兩クハノネノカハ

桑叶枚以酒一斗煮三沸服一升勿令汗出當風立

可用水煮

治婦人脫肛方第十八音五

病源論云肛門大腸椎也太腸虛冷其氣下衝者肛門トホヲル

及出亦有因產用力怒ニ體氣衝其臍亦令及出也トホリ

千金方治脫肛若陰下脫方カスミ

以鐵精傳上灸布令暖以熨臍上漸推內之ハシイ

集驗方治婦人脫肛若陰下脫方カスミ

地床子布裹灸熨之ハシイ主治產後陰中痛キンモ

治婦人月水不調方第十九ナル

病源論云衝任之二經上為乳汁下為月水若冷熱調ナリ

和則血以時而下ナリ寒溫乖適則月水乍多乍少不調也ナリ

千金方治月水不調或在月前或在月後或多或少下去ナリ

醫心方卷十一

トヒ

乍来方生地黄三斤モ酒煮取二升服之タ

又方地黄酒及大豆酒亦佳シ

揉要方治月水不調方ナ

以酒服桂末方寸匕日二ニ玄感傳屍方同之モ

新録方治虛僂月經一月再至方ル

夕藥廿二枚重一斤酒一斗漬夕藥令釋ヒキ濡出曝之ウケル乾者復ル

内酒中復曝之如是令酒盡シ燂ウケル棹フルク篩服方寸匕日三ヤク

治婦人月水不通方第廿ナ

病源論云婦人月水不通者由ナ勞損血氣致令體虛受風シ

冷也

千金方治月水不通方ナニ

亭歷子ハタタチ一升ハタタチ鵝カモ蜜ハチミツ和カス彈丸ダンガン三枚さんまい綿裹ワタマ內陰中入三

寸一宿易有汁出也ハルハヤミ

新録方治月水不通方

麻子アサ鵝カモ絞取汁服日三スミ又方オモナカ芎コウ末マタ以酒服方寸匕ハルハヤミ

又方桂心一尺末以酒服日三スミ又方當歸末酒服方寸匕ハルハヤミ

又方小豆一升ハルハヤミ苦酒一斗ハルハヤミ煮取三升服任意ハルハヤミ多少ハルハヤミ立下ハルハヤミ

樣要方療婦人月水不利血瘀不通或一月或一歲令人無ハルハヤミ

子腹堅如石忍如任娠之狀方

大黃四兩 夕藥二兩 土根根一兩

右為散酒服方寸匕日三服下痛即愈

葛氏方治婦人月水不利詰積無子方

大黃桃人桂心各三兩梔末朱食服方寸匕日三

又云或至兩三月半年一年不通者

桃人二升麻子人二升合梔酒一斗漬一宿服一升日三

夜一

治婦人月水不斷方第廿一

病源論云衝任之氣虛損故不能制其經血故令月水不改九
僧深方治婦人月水不止方トテラ

黃連治下篩以三指撮酒和服不過再三ト

又方服淳酢一坏不差更服ヤ

撰集要方治月水不止方 服蒲黃良ヤ

千金方月水不斲方 葵內躁下白肉際青脉ヤ

治婦人月水腹痛方第廿二キ

病源論云月水來腹痛者由勞損血氣體虛受風冷故元

令痛也カラ

省婆方治婦人月節來腹痛血氣方

防風二兩ハナカサ生薑六兩ホウカハ厚朴三兩アサキ甘草二兩ツネラ木二兩

枳實二兩カラタチノア桔梗一兩アリシキ

七味切以水六升煮取一升半去滓サケカレ分為三服サシ

僧深方治月經至絞痛欲死伏苓湯方

伏苓三兩アサボト甘草二兩モルケ芍藥二兩モルケ桂二兩モルケ

凡四物切以水七升煮取二升半分三服

百病針灸治月水來腹痛方鹿丸灸中極穴在舍脊下四寸ツネラ

廣洛方治月水腹痛方

當歸 甘草

各八兩

芍藥 茯苓 桂心 各十二分

以水六升煮取二升絞去滓分溫三服別相去如

人行六七里忌生

冷海藻

治婦人崩中漏下方第廿三

病源論云崩中之病是復損衝脉任脉衝任之脉起於胞

內為經脉之海勞傷過度衝任氣虛不統制其經故血

忽然崩下謂之崩中而有瘀血故時崩時止淋瀝不

斷名曰崩中漏下也

又云漏下不止致損五藏之血隨藏不同同虛其五色

与面而俱下其状白者如涕赤者如红汁黄者如爛依汁

青者如蓝色黑者如酃血也

鋪林又說文云血紫也

小品方治婦人崩中晝夜十數行醫所不能治方

芎藭八兩 右一物以酒五升煮取三升分三服不耐酒

者随多少服之 千金方同之

又治婦人五崩下赤白青黄黑大棗湯方

大棗百枚 黄耆三兩 膠八兩 甘草一尺

凡四物以水一斗煮取三升半内膠令洋分三服

今案本草云甘草一尺者重二兩為心

又治漏下神方

取槐耳五ノミノクヒク燒ト搗下篩モ酒服ヤ方寸匕ト日三イ愈ト
今案千金方燒酒服之

又治婦人漏下病不新積年困ナ為方九

取鵲重巢ヒル柴シハ合燒末服方寸匕日三モ鵲重巢者去イヌル

羊在巢中カキナクヘル產コナ今歲更在其上コナ復作巢是也ト集驗方モ

又治崩中去血方七ク

春生葡萄根汁ハナニ一升アセ溫頓服之ヤ可以酒煮モ隨意服之

又方春生地黃汁ハナニ一升アセ頓溫服之ヤ即心モ
已上千金方同

鑿門方カ治久崩中晝夜不心モ鑿不能療方九

芎藭オウゴン八分 生地黄汁一升

凡以酒五升煮取二升去滓下地黄汁煎一沸分三服相去八九里不耐酒者随多少數服即止但此二味可單用服之

千金方治婦人漏赤不止晝夜上氣虛竭方

龜甲カメ牡蠣シカミ二味カメノミ分等為散酒服方寸匕日三

又方燒乱髮服方寸匕日三

又治五色帶下方

大豆紫湯日三服佳 又方煮龍帶汁服之又

方服カキハク補黃

又灸崩丸中方

灸小腹橫文カキハク當臍孔直下一百壯又方灸開

元兩旁相去三寸

葛氏方治婦人崩中漏下及月去青黃赤白使无子方

麻茸二兩カキハク當歸二兩カキハク補黃二兩カキハク

鵲篩酒服五升カキハク日三加至方寸匕カキハク錄驗方同之

又方赤石脂蜜丸服如梧子三九日三

又方露蜂房燒末三指撮酒服之良カキハク

廣利方治崩中漏下血方陵霄花末エカキノハナノモ温酒服方寸匕日三モ即心

僧深方治崩中方

桑耳クサノミ干薑シロハハカ等下篩酒服方寸匕日四五

又方白茅根チリ廿斤小葡萄根エモノネ十斤搗絞取汁煮取

五升服一升日三四

経心方治長血芎藭丸方

麻茸二兩當歸二兩蒲黃二兩阿膠反二兩芎

藭二兩白朮三兩干地黄三兩凡七物搗篩和

丸如大豆服十丸日三モ

又方生地黄蓮根各等搗絞取汁煎服任意

龍骨丸治長五方

龍骨ネコノホネ阿膠ニカハ赤石脂セキシジ牡蠣シロキハヒ干地黄カンジ當歸トウキ甘草カンサ

各二兩ネコノホネ補黃ホウ三兩九八物セツ搗篩丸如梧子服十五丸日

龍門方療婦人帶下方

人參ニンジン一兩伏苓フクレイ三兩シカキヲカ牡蠣シロキハヒ五兩別研クタイ篩者末和飲服

酒生得サ日再イニ以差イニ為度又方セツ灸脊左右各一寸

五分各三百壯

集驗方治婦人漏下不止散方

麻茸三兩カヲネカヲ當歸二兩オホタリ補黃二兩ホノナ阿膠三兩アヲ烏賊骨カヲノコ

二兩去甲下篩為散ハシ酒服方寸匕日三夜子金方寸匕

蘗敬本草ラ注云刮牛黃キモノ服之ヤ

崔禹錫食經云海瀾髀子刮服之キモノ

治婦人瘕下竹例及赤白痢也又作瘕又音帶下病也廿六疾方第廿四三八

病源論云諸方說廿六疾者是十二瘕九痛七客五傷三

固謂之廿六疾也トス十二瘕者所下之物一如膏白二如清血三

如紫汁四如赤肉五如膿痂六如豆汁七如葵莢アヲ八如凝ナリ

血九如清血、似水十如米汁十一如月浼十二經度不應ナリ

胡管及濯也

期也九痛者トウハ一陰中痛傷二陰中淋痛シタテ三小便來即痛

四寒冷痛五月水來腰痛月水止則トモ一

不止六氣滿トブラ崩痛七汗出陰中如虫噬痛ツラ八脇下引痛九

腰痛也七害者一害食二害氣三害冷四害勞五害房

六害任七害睡也五傷者一窮孔痛二中寒契痛三

少腹急カクク牢痛四藏不仁五子門不正タシカラ引背痛三固

固者一月水閉塞不通其餘二固者オモル謂子嗣不載オモル今

千金方云三固者一羸瘦不生肌トモ膚二絕產乳三月水閉塞也七害者

一窮孔痛不利二中寒契痛三少腹急堅痛四藏不仁五子門不トモ端

六院乍多乍少七喜此陽精也五邪傷者一兩脇支滿痛二心痛引脇三氣結不通四耶患泄利五前後固塞也云々

千金方白惡丸主婦人卅六疾病各異療之方

白惡ミラハテ三分 龍骨リウコウ三分 夕セウ藥リョウ三分 黃連ワウレン二分 當歸トウキ二分

伏苓フツホト三分 黃苓ワウセイ二分 瞿麥コウマク三分 白斂ハクセツ二分 石棗シタウ二分

甘草カンキ二分 牡蠣ボウキ二分 細辛サイシン二分 附子ブシ二分 禹餘糧ユイリョウ二分

白石脂ハクシジ二分 人參ニンジン二分 烏賊骨ウゼツボネ二分 甘皮カンビ二分 稟リョウ本ホン二分

大黃二分

廿一味下篩蜜丸如梧子未食服十九日二不知ミ稍

增服藥ゾウハク廿日知チ卅日百病悉愈イミヌ今案小品方有桂心四分白ミ

治婦人八瘕方第廿五

麥門冬一名禹餘糧但此方一玉石部禹餘糧歟

病源論云八瘕病者皆胞胎生產月水往來不脈

精氣不調之所生也其八瘕者黃瘕青瘕燥瘕血

瘕脂瘕狐瘕蛇瘕蠃瘕也

千金方婦人血瘕痛方

干薑一兩烏賊骨二兩二味治篩酒服二方寸匕日三

錄驗方治婦人齊下結物大如杵并月水不通發熱往來下

利羸瘦此為氣瘕也故生宗瘕不可治未生宗瘕可治

乾漆丸方

治本候瘕字聲音本亦作瘕字

生地黄三斤一方并取汁干漆一斤熬搗篩

醫心方卷下

下

凡二物地黄搗絞取汁凍治下節內地黃汁中微火

煎令可丸藥成酒服如梧子十五丸當以食後服

之葛氏方同集驗方服三丸

玄感傳屍方治血藏音藏丸如四五月身大方

生薑二斤桂心十兩好酒二斗五升浸前件二味五日以

後取服一服一盞溫服之良

治婦人遺尿方タケニハカ第廿六

病源論云婦人遺尿候腎虛冷、氣入胞、虛冷不能制

小便遺尿也

錄驗方治婦人遺尿方

煖石三兩燒令沸汗盡 牡蠣肉三兩

下節為散酒服方寸匕日三 集驗方各二兩

治婦人尿血方第廿七

病源論云血性得寒則凝得熱則流散若勞傷經

絡其血虛熱滲入於胞故尿血

桂要方婦人無故尿血方

龍骨五兩為散穿腹服方寸匕日三

千金方治婦人无故尿血方

本草云敗
船如容胎
漏處也

卷八十一

取其夫瓜申燒作末酒服之

又方取船故竹茹曝干搗末為散酒服方寸匕日三

葛氏方治婦人溺血方

車前草一斤水一斗煮取四升分四服

又方葵根莖子无在取一升水四升煮取一升內書中

白巢虫十枚研服一合

治婦人瘦弱方第廿八

玄感傳屍方主婦人年老體漸瘦弱頭面風腫骨節煩

疼冷口乾狀如骨蒸者是牛膝酒方

十一

牛膝一斤 生地黄切三升

牛旁根切曝乾一斤

生薑七斤 合皮切一升

凡四味切於絹袋盛之以清酒一大升浸七日温

服一盞日三

治婦人欲男方第廿九

大清經云皇帝問素女對曰女人年廿八九若廿三四陰氣

盛欲得男子不能自禁食飲無味百脉動體候精脉實

汁出汚衣裳女人陰中有虫如馬尾長三分赤頭者問

黑頭者沫

治之方用麵作玉莖長短大小隨意以醬清及三鞭

綿裹之內陰中虫即著來出復內如得大夫其虫

多者廿少者廿

治婦人鬼交方第廿

病源論云婦人夢与鬼交通者亦由府藏氣弱神守

虛衰致鬼靈曰夢而交通也

玉房秘決云采女曰何以有鬼交之病彭祖曰由於陰陽不

交情欲深重即鬼魅假像与之交通之道其有勝

於人久則迷惑諱而隱之不肯告人自以為佳故至獨死而

莫之知也

治之法但令女与男交而勿寫精晝夜勿息困者不
過七日必愈若身體疲勞不能獨御者但深按勿
動之善

又方當以石流黃數兩燒以勲婦人陰下身體并
服席角末方寸匕即愈矣當息鬼涕泣而去
一方云服席角方寸匕日三以老為度

小品方別離散治男女風耶男夢見女女夢見男悲愁
憂悲怒喜無常或半生或數月日復發者方

楊上寄生三兩木三兩桂肉一兩一方茵芋一兩三兩

天雄一兩炮許根一兩藟根昌蒲一兩細辛一兩附子一兩炮

干薑一兩九十物合檮下後涓服半方寸匕日三合

藥勿令婦人雞犬見之又令見病者家人見

合藥知藥者令耶氣不去禁之為驗

千金方治婦人忽與鬼交通方

松脂二兩雄黃一兩二味先洋松脂乃內雄黃末以

帛絞令相得藥成取如鷄子中黃夜卧以

著薰籠中燒令病人自昇其上以被自覆唯

出頭勿令過契カシヲ許シムル及令氣得泄フシムル也エモラハル

玄感傳屍方主婦人患骨蒸者多夢与鬼夫交接為之方凡三凡凡

雄黃一兩破 虎爪一枚未 沉香一兩未 青木香一兩未

松脂二兩破

凡五味合和以蜜丸コト如彈丸凡內火籠中以薰陰凡合

夜別一度大良ヨエト

治婦人令斷生產方シム第卅一シムヤ

小品方云婦人欲斷生方凡ル

故布方負一尺燒作屑以酒飲之凡終身不生ト

產

千金方云新產方

灸右踝上一寸三壯即新

又方蝨子故布方尺燒末酒服之

醫心方卷第十一

醫心方卷第廿一札記

三頁下

捋去

病源捋

喘引

病源喘

五頁上

癱也

病源

此下有足陽明之脈有從缺盆下控乳者旁

九蕩風

病源蕩

七頁上

炁氣

病源炁

下六

汞粉

汞粉旁記有

二及則舊有作汞亦或作汞者此當作汞為是蓋汞之

作汞猶為之作為莫之作莫之類並是增畫下六從水

七有汁有

外臺無

行熟樓

按

十一頁

濃劇

濃劇

十五頁

上

千金

穿

二莞糸子

千金作

下四

金底黑

黑即

新胡摩

以塗之

千金作研胡麻以傳之非是也八卷少女痛并

十七頁
上一行怒體病源作

十九頁
上一行不改病源改

廿頁
下一行

行五而病源無
而字

廿四頁
上一行月水止則不止病源無此六

字
三行汗出病源汗

七行謂乎病源作
文一字
注九行五邪傷

千金無
邪字
廿六頁
上一行汗盡汗怨
廿七頁
下一行大夫犬訛
八

貞上
五行以勲勲訛

醫心方卷第廿二

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

任婦脉圖月禁法第一

任婦循身法第二

任婦禁食法第三

治任婦惡阻病方第四

治任婦養胎方第五

治任婦悶瞞方第六

治任婦胎動方第七

治任婦落胎方第八

治任婦胎墮血不止方第九

治任婦胎墮腹痛方第十

治任婦胎上迫心方第十一

治任婦漏胞方第十二

治任婦下黃汁方第十三

治任婦頓仆舉重法方第十四

不安 與篇目有此三字

數 與篇目有一字

治任婦驚走高墮下血方第五

治任婦為男所動欲死方第六

治任婦胃煩吐食方第十七

治任婦心痛方第十八

治任婦心腹痛方第十九

治任婦腹痛方第二十

治任婦腰痛方第二十一

治任婦脹滿方第二十二

治任婦體腫方第二十三

治任婦下利方第二十四

治任婦小便數方第二十五

治任婦尿血方第二十六

治任婦林シタケノリ便不利方第二十七

治任婦遺溺タシユリ方第二十八

治任婦霍乱方第二十九

治任婦瘧病ホウハヤ方第三十

治任婦温病方第三十一

治任婦中惡方第三十二

驚走 高墮 下血

本 真篇目作之

ホウ

エタベ

シタケノリ

無篇目作治任婦淋病方第三十一

タシユリ

ホウハヤ

治任婦欬嗽方第卅三

治任婦時病令子不落方第卅四

治任婦日月未至欲產方第卅五

治任婦胎死不出方第卅六

治任婦欲去胎方第卅七

任婦脉圖月禁法第一

產經云黃帝問曰人生何以成岐伯對曰人之始生於寘

乃始為形容無有擾乃為始授任身一月曰脉又曰胞二月

曰胎三月曰血脈四月曰具骨五月曰動六月曰形成七月曰

毛髮生八月曰瞳子明九月曰穀入胃十月曰兒出生也

夫婦人任身十二經脉主胎當月不可針灸其脉也不禁

今案大素經云二月高二月脉育胞四月胎五月動六個月骨七月成八月動九月躁十月盛

婦人經水不調

二

皆為傷胎復賊母也。不可不慎。宜依月面而避之。


懷身一月。名曰始形。飲食必精。剪酸美無滯。丈夫無食。

辛腥。是謂始載。負也。病源論云。宜食大麥。

一月。足厥陰脉養。不可針。其經也。厥陰者是肝。主筋。

亦不宜為力。事寢必安靜。無令恐懼。

足厥陰肝脉圖



足厥陰肝脉圖

三

募音募明堂經云募猶盛也

輪同經云泉輪為廣府之精

上列之於背

右肝脉穴自太敦上至陰廉各十二穴又募穴名期門

又輪二穴在脊第九椎節下兩傍各一寸半上件諸孔並

不可針灸犯之致危


懷身二月名曰始膏無食辛カラク滕居必靜九ナリ處男子勿勞

百節骨間皆病是謂始病源論云勿食辛腥之物藏也二月之時兒精成也

二月足少陽脉養不可針灸其經也少陽者內屬於膽

當謹慎勿驚之

足少陽膽脉面



卷之八

論語

四

一九六八

右膽脉穴自竅陰上至環鉤各十三穴又募二穴名日月在期門下五分又輸二穴在背第十推即下兩傍各半上件諸穴並不可犯之


懷身三月名曰始胎當之時未有定儀見物而化是故應見王公后妃公主好人不欲見倭者朱儒醜惡瘦人猿猴無食菹薑菹宗

思欲食菓菹激味酸菹菹無食辛而惡臭是謂外像而內及故也

三月手心主脉養不可針灸其經也心主者內屬

於心、無悲哀、無思慮、驚動之

手心主心脉圖



心

心

心脉

心

巨關小品方
在龍
頭骨下一寸
是也
明堂經
同之

右心胞脉穴自中衝上至天府各八穴又募一穴名

巨關在心鳩尾下一寸五分又輸二穴在背第五推

節下兩傍各一寸半上件諸穴並不可犯也


懷身四月始受水精以盛血脉其食稻粳其羹魚

鴈是謂盛血氣以通耳目而行經絡也

四月手少陽脉養不可針灸其經也手少陽內屬上

焦茲頤及三靜セウ安ミ形體和順心志セウ節セウ飲食之

手少陽三焦脉圖



右三焦脉穴自關衝上至消灤各十二穴又募一穴在

當膺下二寸名為石門又輸二穴在脊第十三椎節

下雨傍各一寸半上件諸穴並不可犯之

懷身五月始受火精以盛血氣晏起沐浴浣衣身


居堂必厚其裳朝吸天光以避寒殃其食稻麥其

義牛和菜萁調以五味是謂養氣以定五藏者也

五月足大陰脉養不可針灸其經也大陰者內屬於

脾無大飢無甚飽無食乾燥無自灸熨大勞倦之

足大陰脾脉圖



醫心方卷十二

二

右脾脉穴自隱白上至箕門各十二穴又募二穴名章
門在季肋端側卧取之又輸二穴在脊第十一推節下
兩旁各一寸半上件諸穴並不可犯之

懷身六月始受金精以成筋骨勞身無處出遊於


數觀走犬走馬食鷄鳥猛獸是謂變湊理細勸

以養其爪以堅背擦月也

六月足陽明脉養不可針灸其經也陽明內屬於

脾調和五味食甘之和无大飽

足陽明胃脉面




右胃脉自厲兌上至髀關各十六穴又募一穴名中
管在後心蔽骨下以繩量至臍心即以繩中折之
又輸二穴在脊第十二推節下兩旁各一寸半上件
諸穴並不可犯之

懷身七月始受本精以成骨髓勞躬搖脚無使
身動作屈申自比於猿居必燥之飲食避寒必食
稻稬肌實以密腠理是謂養骨而堅齒也

七月手太陰脉養不可針灸其經也大陰者內屬
於肺無大言无啼哭無薄衣无洗浴無寒飲之

手大陰肺脉面



醫心方卷十二

乙


右肺脉穴自少商上至天府各九穴又募二穴名中府
在兩乳上三肋間陷者中又輸二穴在背第三椎節
下兩旁各一寸半上件諸穴並不可犯之

懷身八月始受土精以成膚革密和心靜息イキ無使氣ニク

控ヒク是謂養理而光澤顏色也密

八月手陽明脉養不可針灸其經也陽明者內屬
於大腸無食燥物無忍大起カネハル

手陽明大腸脉苗




右大腸脉穴自商陽上至辟脇各十四穴又募二穴
在脅兩腋各二寸半右名天樞尤名穀門又輪二穴在
脊第十六椎節下兩旁各一寸半上件諸穴並不可
犯之

懷身九月始受石精以成皮毛六府百節莫不畢
備飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮多
才力也

九月足少陰脉養不可針灸其經也少陰內屬於
胃無寒濕冷無着灸衣

足少陰腎脉面



足少陰腎脉面


二

右腎脉穴自涌泉上至陰谷各十七穴又募二穴在
腰目中季肋本俠脊腴宗前窕中名京門又輸
二穴在脊第十四推下兩旁各一寸半上件諸穴並不
可犯之

懷身十月俱已成子也時順天生吸地之氣得天之
靈而臨生時乃能啼聲遂天氣是始生也

十月足大陽脉養不可針灸其經也大陽內屬於
旁光無處濕地無食木實物

足太陽膀胱脉圖



右膀胱脉穴自至陰上至扶桑各十六穴又募一穴
在臍下直四寸名中樞又輪二穴在脊第十九推節
下兩旁各一寸半上件諸穴並不可犯之

任婦脩身法第二

產經云凡任身之時端心正坐清虛如一坐必端席立
不耶ヨモテ住行住必中道卧キ無橫寢舉目不視邪色起タテ目不
聽邪聲口不妄言無喜怒憂イハレ悲思慮和順イハレ平生聖
子產無橫難也而諸生子有癡チ痴チ醜イハレ惡者其名皆
在其母豈不可不審詳哉

又云王初任ハラヒ之時其母正坐シ不聽邪言ナク惡語口不安語セ

正行端タシム是故生聖子諸賢母宜可慎之

又云任身三月未有定儀ハ見物而為化ル是故應見王

公后妃公主好人不欲見セ倭ヒヤマト者ヒヤマト儒侏ニギハヤヒ醜惡アホク疥人ヒヤマト獼猴ヒル

其欲生男者操弓矢射雄雉ト乘牡馬ウ走田野ウツ觀虎豹

及走馬其欲生女者者簪珥カミビシ施環珮オモウ欲令子ハレト義好者ハレト數視ヒツク

白玉義珠シ觀孔雀ア食鯉魚フ欲令子シタト多智ナラ有力者ナラ當食ヒ

牛心ヒツ御ヒツ大麥ヒツ欲令子ナラ賢良ナラ坐ヒツ無邪ヒツ席立ヒツ無偏行ヒツ是謂ヒツ

以外像而内化者也

千金方云凡受胎三月逐物變化稟質未定故任身

三月欲得見犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子盛

德大師礼樂鍾鼓俎豆軍旅陣設焚燒名香口誦詩

書居處簡靜割不正不食席不正不坐彈琴瑟調心

神和情性節嗜欲生子皆長壽无疾

養生要集云婦人任身太小行勿至非常之地逆產致人

又云婦孕見麋而生兒其四目

又云孕婦三月不得南向洗浴胎不安

又云婦孕三月不得南向小便令兒瘖瘡

又云婦孕三月不得兩鏡相照令兒倒產

膳夫經云任身勿北タル向其生年上大小便ハル使母難ナラ

任婦禁食ル法第三

養生要集云婦人任身ソトキ不得食六畜肉令兒不聰明ナラ

一云壞胎

又云勿食猪肝令胎不生

又云勿食菟肉令子胥缺カラム不須見之ハカラ

又云勿食鷄子カレタレ于音巢音使子多ク倉カヒ

又云勿不得食魚頭胎損ハル

又云食鯉鱠令兒多創カセ

又云勿食生薑令子盈指アデシム

又云勿食于薑桂甘草令胎消胎不安セシメ

又云勿飲冰將令胎不生

又云勿食杏仁及炙飴破損傷子アツキ

又云勿以炙雀并大豆醬食令胞漏使兒多オモカヒ疳ホキア飽ホキア

又云勿飲酒多食雀肉使子心淫精乱シム

又云勿食雀肉令兒多カラシム所欲

又云勿食雀肉并雀ナヒ脂令入雀ナヒ脂

又云勿食雀并梨子令子短舌ナラシム

又云棗并梅李實食之使人清盲ナラシム

崔禹錫食經云任身不可食鳩其子門肥无病於產ヤモフ

難故也朱思簡食經云勿食諸肉令子瘡惡啞无聲ウラシム

又云飲酒醉令兒癰痼ナラシム
癰痼 都賢又 胡山及小兒癰痼也

本草食禁云任身食鷄完并糯米使子腹中多虫モナメ

產經云女人胎任時多食鹹胎閉塞ヒハサ

任身多食苦胎乃動ユキ

任身多食甘胎骨不相著ツカ

癰小兒病
也十歲

癰已上為
癰十歲

癰己下
為癰

也

任身多食酸胎肌完不成

任身多食辛胎精魂不守

今案任婦不可服藥八十二種其名自在產經

治任婦惡阻方第四

國醫多病端目錄有一字

病源論云惡阻病者心中煩頭重眼眩四肢沉重

煩不欲執作惡聞食氣欲散酸菓實多卧少起世云惡食

又云惡字是也乃至三四月日以上大劇者吐逆不能自勝

奉也此由婦人本虛羸血氣不足腎氣又弱魚當風取冷

大過心下有淡水狹之而有娘血既閉水漬於藏氣不宣

故心煩憤氣逆則嘔吐血不通經絡否則四支沉重狹風
則頭痛眩故欲有胎而病惡阻所謂欲有胎而病惡阻所
謂欲有胎者其人月水尚來而顏色肌膚如常但苦沉重憤
悶不用食飲不知患所在脉理順時平和則是欲有胎也
如此經二月日後便覺不通則結胎也

產經云半復伏苓湯治任身姐病心中憤悶空煩吐逆惡聞
食氣頭重四支百節疼痛煩沉重多卧少起惡寒汗出疲

橫極黃瘦方

半復五兩 生薑五兩 伏苓三兩 旋復花兩 橘皮二兩

細辛二兩

芍藥二兩

人參二兩

芍藥二兩

干地黄三兩

澤瀉二兩

甘草二兩

凡十二物以水一斗煮取三升分三服若病姐積日月不得

治及服藥冷熱失候病變客熱煩渴口生瘡者除橘皮細

辛用前胡知母各二兩若變冷下者除干地黄用桂肉二

兩若食少胃中虛生熱大行閉塞小行赤少者宜加大

黃三兩除地黃加黃芩二兩餘藥依方服一劑得下後消

息者氣力冷熱更增損方調定即服一劑陽便急將伏

苓丸能令得能食便強健也

小品方

前胡

小品方云伏苓カハム丸治任身姐病患心中煩悶頭重眩目憎ニゲム
聞カハム飯氣便カハム歐逆吐悶顛倒ツル四支委ツル契ツル不自勝ツル持眠之即ツル
効ツル要先服半复伏苓湯兩劑後將伏苓丸也

伏苓ツル一兩人參二兩桂肉二兩干薑二兩半复二兩橘皮一兩

白朮ツル二兩枳實カラクテラア二兩葛根クハム屑一兩甘草二兩

凡十物ツル搗篩蜜和丸ツル如梧子ツル飲服廿丸漸至卅九日三產經同之ツル

集驗方云治任身二三月惡姐臨吐不下食方

青竹茹ツル三兩生薑四兩半复五兩伏苓四兩橘皮三兩

凡五物切以水六升煮取二升半分三服ツル產經云竹茹湯

又云治任身臨吐不下食橘皮湯方

橘皮三兩竹茹三兩人參三兩朮三兩 生薑四兩 厚朴三兩

凡六物切以水七升煮取二升半分三服

僧深方云治婦人任身惡阻酢心胃中冷腹痛不能飲

食輒吐黃汁方用

人參 干薑 半夏

宇治本无今案三
今案 醫本亦
有

凡三物分等治下以地黃汁和丸如梧子一服三九日三樣

要云方八分稍加至十九產經云人參丸神良

醫門方云凡任娠墮病惡食以所思食任意食必愈

今檢
延齡

圖云令子聰明
賢善端正也

治任婦養胎方第五

僧深方云養胎易生丹參膏方

丹參四兩

人參二分

一方二兩

當歸四兩

芎藭二兩

蜀椒二兩

梹二兩 猪膏一斤

凡六物切以真苦酒漬之凡復天二三日於炭火上煎凡當著

底校之手不得離ハナワ三上三下藥成絞去滓シホリマシ以溫酒服ツキヌ如

棗核ナツメ曰三稍增可加若有傷動見血服ハカリ如鷄子黃者晝

夜六七服サ之神良任身七月便可服至坐卧忽生不覺ル

今檢下字治本
作疏證本等
作今案注也

又治生後餘腹痛也

今檢產經云丹參一斤當歸四兩芍藥八兩
白朮四兩蜀椒四兩脂四斤云云

千金方云安胎魚臙法

鯉魚二斤

生者去鱗

藏粳米一升

有

石相和

作臙少著

塩

勿著鼓酢散之日別三過食之滿十箇月

又方取鯉魚長一尺者水自沒内塩煮飲之

宇治本无
醫今等
有

治任婦臙

方第六

小品方云任身忽悶睬不識人須臾醒復發仍不

醒者名為瘧病也

治之方

息作淡竹瀝汁与之無淡竹者桂竹也善復宜服治瘧

暈葛根湯

集驗方云任身恒苦煩悶者此子煩也治之方

時服竹瀝隨多少良

治任婦胎動不安方第七

病源論胎動不安者多曰勞役或觸冒冷熱或飲食不

適或居處失宜輕者轉動不安重者便致傷胎

醫門方云凡候胎動法母脣口青者兒死母活脣口中青

沫出者子母俱死口赤舌青沫出者母死兒活

又云夫胎動不安方

煮好銀取汁煮苾苾養服之

此法醫家等無不
今案博濟安胎方胎動欲墮腹痛
以清酒煮水并煎取并退分服即止

又云療任娠腹內冷致胎動不安方

温

乾薑三兩 芎藭四兩 艾二兩 水六升煮取二升半分二服

又方苾苾切一升當歸四兩清酒五升煮取二升分温二服

大効

又云療任娠忽被驚駭胎向下不安少腹痛連腰並

下血方

當歸 芎藭 阿膠 人參 大棗十二枚

艾葉八分 伏苓十分

水七升煮取二升半分三服心相去八九里

小品方云治任身腹中冷膝不安方

甘草アトキ 當歸各二兩オホセリ 干薑三兩クレハヒカア 大棗十二枚セカ

凡四物以水五升煮取三升分三服

又云治母有勞凡熱動胎ラ不安去血手足煩方

生甘竹皮二升オナレキ タケカハ 當歸二兩 芎藭兩 黃芩半兩イタコシキ ヒシキ

凡四物以水一斗煮竹皮取六升汁去滓カ凡 イレ內煎取三升

分三服ヒニ

葛氏方云任身卒胎動不安或胎轉ツキ搶心ヒナ或下血不止方

葱白一把キウネ以水ミヅ煮シ令葱熟飲其汁今抄本草云ハ草一托者二兩為正

又方生薑二斤シヤク林米ミ一升シヤク調作臠ツクリ頓食之トモウ

集驗方云治任身胎動晝夜叫呼ヒキフロ禁脣寒及下利ツクヒ

不息方ヤテ

已治艾葉一管クタケルヨモギ以好酒五升煮取四升去滓更煎ハコ

取一升一服口閉トヂハ者開口灌之藥下即安ヤルヌ今檢僧深方云艾及藥物管者

以二升為正

又云治任身三三月至八九月胎動不安腰痛已有所見方

艾葉三兩阿膠ニカン三兩灸芎藭オウコウ三兩オウコウ當歸ヤエヤリ三兩甘草オウ二兩灸

切以水八升煮取三升去澤澤內イレ膠更ヤメテ上火上アケ膠消トケス分三服

產經云治任身七八月腰腹痛胎不安汗出逆冷飲食不

下氣上煩滿フホ四支痺ヒル當歸湯方

當歸三兩ヤメセリ芍藥二兩モウクハナリ千地黄三兩モウクハナリ生艾一朶甘草一兩

膠四兩ニカハ炙炙生薑一兩クレハシカア橘皮二分

右八物切以水一升煮得三升去澤澤內シメ同カセ膠トカ令モ洋モ分四服之

又云任身臨生月胎生月胎動不得生方

桑上寄生五分クワウキヲホヤ甘草二兩クハアホヤ桂心五分ヲニウヤカラ伏苓五分

右四物以水七升煮得二升分三服

録驗方治胎不安生鯉魚湯方

生鯉魚一頭重五斤 干薑二兩 吳茱萸一兩

凡三物切以水一升升兒煮鯉魚五沸出魚內藥煎取

三升服一升日三

治任婦數落胎方第八

病源論云陽施陰化故得有胎榮衛和調則經養周

之故胎得安而能成長若血氣虛損者子藏為風冷所

傷不能養胎所以數墮胎任娠而恒腰痛者喜墮胎也

產經云治數落胎方

作大麦ルキウアツキ鼓羹クキ食之即安胎ルカ

又方取母衣帶三寸燒シ末セ擘服即安セ

錄驗方云治任身數落胎方

以生鯉魚二斤粳米一升作臠ツツキ少与塩散之ル日三過シタマフ

食至兒生ハナレル

治任婦胎墮血不ハナ心方第九

病源論云任身胎墮損經脉故血不ハナ心也ハナ寫血ハナ多者致死キ

葛氏方云治胎墮血露不盡方

艾葉半斤酒四升煮取一升頓服之

樣要方云治胎墮血不止方

丹參十二兩二カハ酒五升煮取三升分三服即止

入方阿膠二カハ五兩灸干地黄五兩以酒五升煮取一升半空

腹分再服セヨ今案博僧安衆方藥各二兩酒升煎取一升

僧深方云生薑キレル切五升キレル以水八升煮取三升分三服

治任婦墮胎腹痛方第十

病源論云此由墮胎之時餘血不盡故令腹痛ヨルカ

葛氏方云治墮胎後心腹絞シホ絞イタキ痛方

豉三升タケ生薑五兩タケ葱白十四枚ネギ酒六升煮取三升分三服

千金方治チ云落胎後腹痛方

地黄チ汁八合ハセ湄ハセ五合ハセ以ハセ煮ハセ分三服

僧深方云治墮身血不盡去トニラハセ苗苦煩滿方ハセ

香豉ハセ一升半ハセ以水三升煮三沸滴取汁ハセ內成未ハセ庶角一ハセ

方寸匕服ハセ須臾血下煩止ハセ今檢千金方云麻角一兩

治任婦胎上迫心方ハセ第十一

葛氏方云治任身胎上迫心方

取弩弦急帶之立愈ハセ

又方生麴半斤ハセ碎水和絞取汁三升分二服

又方生艾搗絞取汁三升膠四兩蜜四兩合煎取一升五合頓服之

治任婦漏胞方第十二

病源論云漏胞者謂任娠數月經水時下也ル又名胞祖
漏血盡則斃ツクレハシメヌ

醫門方云夫漏胞者促娠下血如故血下不絕胞乾便死

生地黄汁一升 擘五合和煮一沸分二服

廣利方同之

又云療任娠下血如月水來若胞乾非祇致胎夭損其母

方

干薑 乾地黄

各五兩

未湄服一匙

セリ 日夜三四服

セリ 即心今檢

集驗方云干地黄四兩干薑二兩湄服方寸匕日三

葛氏方云任身月水不心名為漏胞治之方

阿膠ニカハ五兩于地黄五兩湄五升煮取一升半未食温再服

千金方云任身血下不心方

生艾葉ナアレキ一升湄五升煮取二升分二服冬用莖

又方燒枰ハカリ銚オモヒ令赤シメ内湄中沸定出銚飲之

集驗方治任身血下不止血盡子死方

干地黄搗末シ以三指撮目酒服セ不過再服ル

產經云治任身血出不止方

干地黄十兩以酒三升煮得二升分二服良セ

又方灸胞門七壯開元左右各二寸是也セ

治任婦下黃汁方第十三セ

子母秘錄云妊娠下黃汁如膠及小豆汁方ル

糯米一升黃耆五兩セ

右二物切以水七升煮取三升分四服今案產經搗地黄取汁以酒合煎頓服

治任婦頓仆舉重去血方第十四ル

錄驗方云治任身頓仆タレ奉重去血方

取淡竹ツル斷頭燒中央以器承取汁一升飲之

僧深方云治任身由ヨリ於頓仆ニガ及舉重去血方

字治奉無此方醫本等有之
搗黃連引下篩以酒服方寸匕日三乃止

又云取生青竹引薄ニガ刮取上青皮以好酒一升和三合許

一眼

普錄有下血二字

治任婦卒走高墮方第十五

產經云治任身婦人卒ホシ墮シヨリ後高墮下暴大去血數斗

馬通陽方

馬通汁ウツシ三合シル 絞取キリ 干地黄二兩干ゼリ 當歸二兩ニカハ 阿膠アノ 罌粟ウツキ 艾葉アハ 三兩

右五物切以水五升煮得二升半去滓イレ 內膠モカハ 更上火ヤケ 令シメ 洋カリ

分三服ミセ 大良ミセ 馬通是馬矢ウツシ

治任婦ウツメ 為男所動ウツ 欲死方第十六ウツメ

產經云治任身ウツ 為夫所傷ウツ 動欲死方ウツメ

取竹瀝汁ウツ 與飲ウツ 一升則愈ウツ 不羗ウツ 後作ウツ 千金方云立驗ウツ

醫門方云若因房室ウツ 不血ウツ 名曰傷胞ウツ 治之方ウツ

乾地黄十兩ウツ 未涓服ウツ 方寸匕日三夜一若腹內冷ウツ 加乾

黃服之ウツ

治任婦胃煩吐食方第十七

產經云治任身胃中煩熱區吐血不欲食、輒吐出用諸

藥無利唯服牛乳則愈方

牛乳微煎如酪煎法適寒溫服之多少任意初服少

少若減之良驗

治任婦心痛方第十八

病源論云心痛者多是因風邪痰飲乘心之經故也

葛氏方云刮取青竹皮以水煮令濃絞去滓服三升

者婆方云高梁薑三兩以水一升半煮取半升去滓分三服

或作高涼
又作高良

千金方云燒來二十七枚トナリ末以尿服之セヨ立驗トアリ

僧深方云吳茱萸カラハハシカア五合以酒煮カセ三沸シ分三服タニ

治任婦心腹痛方第十九

產經云治任身心腹セシ刺痛方キ

燒棗十四枚クダキ治末セヨ以小便服之ト立愈小呂方同之

小品方云治任身心腹刺痛方

塩燒シメ令赤熟セ三指撮トキ酒服之セヨ立差ト

治任婦腹痛方第廿

病源論云任身腹痛者トナリ因風邪セヨ入於府藏セヨ所成トナリ

葛氏方云秤錘燒正赤ハカリヲ以著酒中令三沸出錘飲酒タビシ

集驗方云赤小豆東向戶中吞ハル二十七枚良シヤクナナナハチ

產經云キウネ葱白ネ當歸ハセリ切酒五升剪取二升半分再服キレ

耆婆方云イリ煖塩令シ契布裹与カラ熨之乃停ツム

千金方云生地黃三斤搗絞取汁酒一升合煎ツボ咸半頓服シ

治任婦腰痛方又方燒車鉅脂末内酒中服之第廿一シホ

病源論云腎主腰脚風冷乘之故腰痛ノル

小品方云治任身腰痛如折方キナレ

大豆三升以酒三升煎取二升服之ナシラレタルカ

葛氏方云治任身腰背痛如折方

末麻角酒服方寸匕又方葱白煮汁服之驗

又方膠桂各二尺鵠以酒三升煮得一升去滓盡服

醫門方云療任娠卒腰痛及覆不得如折方

庶角一枚五寸截之燒令赤內酒二升中浸之冷又燒之

如此數度便空腹飲此酒極佳

僧深方云治任身腰痛方

熬塩令熱布裹与慰慰之

治任婦脹滿方第廿二

產經云治任身平心腹物急痛脹滿氣後少腹起上衝

心煩起欲死是水飲食冷氣所為伏苓湯方

伏苓二兩 當歸三兩 甘草二兩 炙 黃苓一兩 水三兩

石膏如鷄子一枚 杏仁廿枚 芍藥二兩 芒消一兩

右九物切以水八升煮取三升內芒消上火令沸之服一

升當下水或吐便解

又云治任身腹痛心胃脹滿不調安胎當歸丸方

干薑一分 當歸二分 芎藭二分 膠四分

右四物下篩蜜丸如小豆服五丸日三

治任婦體腫方第廿三

病源論云此由藏府之間有停水而任娠故也

錄驗方云治任身體腫方

生鯉魚一頭長二尺完用水二斗煮取五升食魚飲汁

又方葵子一升伏苓三兩下篩服方寸匕先食日三小便利

即止

鑿門方云治任身四支煎腫皮肉物急方

常陸根切一升赤小豆三升桑根白皮切升水一斗二升煮

二味取七升去滓內小豆煮令熟然食豆渴飲汁小

便利即差イマ

千金方云治任身手足皆腫ハレ攣急方イ

赤小豆五升 常陸根一斤 梓漆ハヤシ一斤

三味水三升煮取一升恒服イマ

集驗方云小豆五升好豉三升以水一斗煮取三升分上服イ

葛氏方治婦人任身之腫方

大豆二升モ湄モ三升煮取二升頓服之イマ

治任婦下利方第廿四ニカ

產經云治任身暴下シ不心腹痛石菖皮湯方

安石^{ウツ}當皮^{ヤエリ}二兩 當歸^{ヤエリ}三兩 阿膠^{ニカイ}二兩 熟艾^{イフシ}如鷄子^{ハカリ}大二枚

右四物以水九升煮取二升分三服

又云治任身下利赤白種帶下黃連丸方

黃連二兩 甘草二兩 干薑二兩 吳茱萸二兩 烏梅^{ホシクワ}卅枚

熟艾二兩 黃蘗^{キハク}二兩

右七物下篩蜜和丸如梅子^{ハカリ}一服五九日三

醫門方療任娠^ヲ注下^{治リキヒテ}利^不止^格或水或膿血方^{如丸}

熟艾二兩 石榴皮^{ウツカハ} 阿膠^{ニカイ} 各三兩

水四升煮取一升半分三服 集驗方同之

又云療任娠利白膿腹内冷方ニカ九

干薑四兩 赤石脂二兩 粳米一升 漿令黃モ

水七升煮取二升半分三服モ

千金方云白楊皮一斤水一斗煮取二升半分三服モ

治任婦小便數方第廿五ヤナキリ

病源論云腎氣通於陰腎虛而生熱則小便澀數九

錄驗方云治任身卒暴小便數不能自禁止方ニカ

桑螵蛸十四枚 凡一物作散溫酒服分爲再服ヲキナフフク
オホチカクリ
ニカ
ナル
モ
セ
ヤ
ヤナキリ
ニカ
九
産婦

治任婦尿血方第廿六

病源論云尿血者有熱氣乘於血、得熱故尿血

產經云治任身溺血方

取其凡甲及髮燒作末、酒服之

又方龍骨治下三指撮先食酒服日三

又方廉角屑二兩熬大豆卷二兩桂心二兩

三味下篩酒服方寸匕日三

葛氏云治任身尿血方

取黍藁燒末服方寸匕日三

治任婦淋病方第廿七

病源論云任身之人胞繫於腎、患虛熱成淋、謂之子淋

錄驗方云葵子一升以水三升煮取二升分再服、切根用之

千金方云葵子、伏苓一兩為散水服方寸匕日三

醫門方云治任娘患淋小便澀水道熱痛方

車前子五兩葵子一升水五升煮取一升半分二服

產經云任身小便不利方

葵子一升榆皮一杞以水二升合煮三沸去滓服一升日三

又方滑石以水和泥於齊中厚二寸良

治任婦遺溺方茅朮

胡鷺曾班
有里聲云

產經云治任身遺溺方

取胡鷺標中草燒末服半錢上水酒無在

又方龍骨治末三指撮先食酒服日三

又方白麋十分藥十分治下瀉服方寸匕日三

治任婦霍乱方第廿九

產經云治任身霍乱甘草湯方

甘草二兩厚朴三兩乾薑二兩當歸二兩
治本無注醫本
今案傳清安衆有

右四味切以水七升煮取二升半分三服日三
方藥各兩水三
升煎取一升
分三四服

樣要方云任娠飲食不銷成霍乱心腹痛大吐胃心

淡厚朴湯方

當歸四兩 人參三兩 厚朴三兩 芍藥二兩 干薑二兩

以水九升煮取二升半分三服 羸人分四服

治任婦瘧方第廿

產經云恒山一兩 甘葛半兩 枳子二兩 葱白四株

凡四物水五升煮取二升未發服一升 臨發復服一升

自新

僧深方云竹葉一升 恒山一兩 水一斗半煮竹葉取七

升半內

恒山漬一宿明且煮取二升半再服先發一時一服

發一服盡去竹葉內恒山

集驗方云恒山二兩甘草一兩黃芩三兩烏梅十四枚碎

石膏八兩碎綿

凡五物切以酒一升水一升半合漬藥一宿煮三四沸

去滓初服六合復服四合後服二合凡三服方恒山三兩甘草

治任婦溫病方第卅一烏梅半兩石膏半兩酒非浸一宿剪數沸去滓分三服

產經云治任身溫病不可服藥方

取竹瀝二升煎之減半適寒溫服之立愈良

宇治本無今案
已下注醫本
寺有

又方以井底泥塗病處良 又方以人尿塗隨其痛

處良

治任婦中惡方第廿一
產經云治任身中惡心腹暴痛逐動胎少腹急當歸

葱白湯方

當歸ヤナセリ四兩 人參カウニケク二兩 厚朴ホク二兩 葱白キウホ一唐口膠ニカハ二兩

芎藭オチカツラ二兩

右六物以水七升煮取二升半分三服セヨ

又云吳茱萸酒方吳茱萸五合以酒三升煮三沸

分三服良ニセヨ

治任婦^{口代又}欬^{シツキ}方第卅三

產經云治任身^{シツキ}欬逆若傷寒^{カチ}欬人參湯方

人參 甘草 各二兩 生薑五兩 大棗十枚

凡四物切以水四升煮取一升半分二服良

治任婦時病^{シムト}令子不落^{セラ}方第卅四

千金方云竈中黃云水和塗^{カケ}香方五寸^{カケ}于復塗之^{カケ}今檢^{カケ}葛氏

方云塗腹上

又方泔清和塗之^{カケ}和酒塗並良^{カケ}今案葛氏方云塗腹上

葛氏方云取井中泥心下三寸

治任婦^ニ日月未至^ル欲產方第卅五^{ルル云九}

小品方云搗知母^{ヤトシ}和蜜^シ為丸如梧子^{ヤトシ}服^セ一九痛不止^ル更服^セ

一九

崔侍郎方云戶根^{トシキアリ}下云三指撮^セ酒服^セ之

葛氏方云竈中黄土^{コト}未以^シ鷄子白^{コト}丸如梧子^子吞^ム一九

治任婦^兒胎死不出方第卅六

小品方云治月未足^シ胎死不出^ル母欲死^ル方

大豆醋煮^{ヒシホ}服^セ三升^ヤ死兒立出^ト分二服^{タニ}之^セ千金方葛氏方同^ニ

又方桃白皮^{キカイ}如梧子^{ヤトシ}大服^ヤ一九立出^ト

又方好書墨三寸末シ頓服ト

又方塩ナナシ并鷄子二枚和頓服之ト

又方瞿麥ナナシ二把煮令二三沸飲其汁立產ト一方下篩服ト

方寸匕

醫門方云瘵胎死腹中不出其母氣欲絕方ト

水銀二兩吞之見立出ト

又方伏龍カサ下去下篩シタラツチ三脂セチ撮以酒服即出ト

產經云治任身子死腹中不出方ト

取赤荃牛膝根クキサウクワウ碎クタイ以沸湯液之飲汁見立出ト

又云周德成婦懷身八月モウニツトシ狀モウニツトシ允緣シ亡其腹中兒背折ヲ

胎死一

腹中三日困篤方ナニ

取黑大豆一升ナニ熬イリ以漬酒一斗ヒタ漬之ヒタ湏更ナニ釋ナニ去豆可得

三升汁頓服即下胎ナニ

治任婦欲去胎方第卅七ナニ

產經云治任身胎二三月欲去胎方

大麦麴五升以清酒一斗ナニ合ナニ煮令三沸ナニ去滓ナニ分五服當

宿不食服之其子即麋腹中令母不疾千金ナニ易ナニ千金ナニ方同之

小品方云任身欲去子方オモテク

栝樓カラシ三兩クナ豉シ一升シ桂心クイシン三兩

凡以水四升煮取一升八合分三服ミ

又方附子二枚クサイ治作膚以好苦酒ヨキ和塗ヌル危足心即去タ

大良駘ハナハタ

又云婦人得溫病欲去腹中胎方オモ

取鷄子一枚オモ扣之以三指撮クサ塩量鷄子中服之立出タリ

又方取井底泥手書其腹立出神良ナリ

千金方云任身得病事煩去胎方

序本有此方

麥蔴子マコ一升シヨウ末和蜜ミツ一升服之神効セキ

葛氏方云或不用ナク理欲去胎方

玳瑁ダイモウ燒未服一枚イチ即下

錄驗方云煮中ナカ膝根服之

如意方云去胎術

以守宮シウコウ若蛇ニョウ肝カン臍シ和塗ニホ膏有子即下オウル永无復有

又煮桃根トウコン令極濃キョウナウ以浴シ及漬ヒタセ膝胎下オウル

槎要方云任娠欲去胎方

瞿麥コウマク半斤桂心ケイシン三兩サンリョウ蟹カニ爪ツメ一升シヨウ牛膝ニウキツ五兩

右以水三升酒五升煮取一升分三服

又云去胎後血下衝心方

生薑切五升ウギル以水八升煮取三升分三服

醫心方卷第二

醫心方卷第廿二背記

治任婦中盛方音古毒之

子母秘錄云靱皮燒治末服方寸匕須臾自呼鼻主姓名

以上第卅四葉

醫心方卷第廿二札記

一頁上 悶睞仁和寺奉 二頁下 無御大夫千金作受

五行 麥六 四頁下 苗薑仁和寺奉 七 激味仁和寺奉

六頁下 灸獎千金灸 七頁下 細勸千金細 六 其爪

千金爪 十三頁 邪席邪即邪 十四頁 勿不得勿字

十六頁 心煩憤病源憤作 六 姐病千金作 憤悶

千金作 下八 一剖陽湯訛陽千 十七頁 委獎千金

下八 云方誤倒 十八頁 号睞也仁和寺奉 頁

上二 冷胙仁和寺奉 下三 口禁禁恐 下八頁 致絞

痛致訖
致訖
廿三頁上
麻甬
仁和尚寺本
行
下四
胞祖
仁和尚

祖作
廿四頁上
三行
眉服
眉即
廿五頁上
九行
馬通陽
湯訖陽仁
和寺本作

湯
行
下一
阿膝
仁和尚寺本
行
後作
仁和尚寺本
行
九
乾

黃
仁和尚寺本
廿六頁上
二行
區吐
仁和尚寺本
行
下一
燒來
仁和尚

寺來
廿七頁上
五行
咸半
仁和尚寺本
行
廿八頁上
三行
黃苓
仁和尚

苓作
行
下
煎腫
仁和尚寺本
行
上
九頁
澤深
仁和尚寺本

四恒服
仁和尚寺本
六并搗研以水和麵
伏以此下有又方大麻子
行

差出督婆方又方燒秦牛矢
行
五
上服
二訖上仁
和

服之
廿一頁
一行
標中
仁和尚寺本
行
下
二頁
去竹葉肉恒

山

仁和尚寺本同案此謂先焚竹葉取

世三頁

遂動胎

仁和尚寺本

下六

費云土龍

世四頁

戶根下云

土龍

世五頁

狀兒

仁和尚寺本

下九

事煩

千金作煩一字

頭外

世六頁

即下

仁和尚寺本

--	--	--	--	--	--	--	--	--

醫心方 五

日本古典全集之内

編纂者

正宗敦夫

發行者

東京市豐島區長崎町三丁目一六一
合資會社 日本古典全集刊行會
代表社員 長嶋東一

印刷者


東京市荒川区池袋新町一二
單式印刷株式會社 和田助一


發行所


東京市豐島區長崎町三丁目六一
合資會社 日本古典全集刊行會
振替東京七三〇三二

昭和十年六月十日印刷
昭和十年六月十七日發行

【非賣品】









UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

WILLIAM H. DONNER
COLLECTION

*purchased from
a gift by*

THE DONNER CANADIAN
FOUNDATION

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 03056 4843

